Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G39111 4794 Estudi genètic de la malaltia de Wilson (gen APT7B)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambient (15-25) ºC; ≤ 4 dies a nevera (2-8) ºC;
(Indica com conservar la mostra)

G75211 4795 Estudi genètic de la malaltia de Wilson (gen APT7B)(cas familiar

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambient (15-25) ºC; ≤ 4 dies a nevera (2-8) ºC;
(Indica com conservar la mostra)

H00572 4251 Ers(San)—Acetilcolinesterasa; c.cat.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q01685 4248 Srm—Àcids biliars; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 8 hores

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a 20 ºC; ≤ 7 diess a (2-8) ºC; ≤ 12 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

N00585 4270 Srm—Àcids grassos de cadena molt llarga

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

N01158 4247 Uri—Àcids orgànics

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal i conserveu a ≤-20 ºC, abans de les 2 h de l'extracció. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 mesos a (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)

N22966 4331 Pla—Acilcarnitines; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient En dejú.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP:* *10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Adjuntar HC.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari i congeleu immediatament. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 30 dies a (-16 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K01385 7022 Srm—"Activitat hemolítica del complement (via alternativa)"; prop.arb. (AH50)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra el sèrum s'ha de congelar en menys de dues hores després de la recepció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necesiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitu ≤ □5 h a temperatura ambient; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

K01485 7073 Srm—"Activitat hemolítica del complement (via clàssica)"; prop.arb. (CH50)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap transparent de 5mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10000724*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Condicions d'obtenció de la mostra Deixar coagular la mostra de sang en nevera (4-8ºC) entre 1 i 2 hores [151].

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el sèrum al recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necessiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitu -20 ºC fins a 30 dies [245]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A25485 7888 Srm—Adalimumab; c.massa(CLIA)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a□□ temperatura ambient (18-25) ºC [7];□ ≤ 8 dies a (□□2-8) ºC□□ [7]; ≤□□-20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

C26066RR 1847 Pla—ADAMTS-13 (activitat); fr.cat.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Si se sol·liciten conjuntament les magnituds Pla—ADAMTS-13 (activitat); fr.cat. I Pla—Anticossos anti-ADAMTS-13; c.arb., han de fer-se dues alíquotes de 0,5 mL cadascuna

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a (22-25) ºC; ≤ 14 dies a ≤ -20 C.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q01744 3566 LCR—Adenosina-desaminasa; c.cat.

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q01744U 9706 LCR—Adenosina-desaminasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºc
(indica com conservar la mostra)

Q01743 3564 LAs—Adenosina-desaminasa; c.cat.

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q01743U 9704 LAs—Adenosina-desaminasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºc
(Indica com conservar la mostra)

Q01749 3562 LPl—Adenosina-desaminasa; c.cat.

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Q01749U 9705 LPl—Adenosina-desaminasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q01747 3565 LPe—Adenosina-desaminasa; c.cat.

Tipus de mostra Líquid pericàrdic **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

C00667 1815 Pqs(San)—Agregació induïda per l'ADP; incr.transmisió

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

C15867 1824 Pqs(San)—Agregació induïda per TRAP6; incr.transmisió

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,25 mL

Preparació pacient Repòs relatiu (15 - 30 minuts), prohibit fumar (30 minuts abans), prohibida la ingesta d'aliments greixosos (4h abans).

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra (PPP) Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC
(PRP) Centrifugueu a 200 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a temperatura ambient
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

PERESTR 1821 Agregació plaquetària induïda, expressat per:

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient Repòs relatiu (15-30 minuts), prohibit fumar (30 minuts abans), prohibida la ingesta d'aliments greixosos (4h abans)

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 170 g durant 5 min a 25 ºC, separeu el plasma, torneu a centrifugar el recipient de mostra primari a 1880 g durant 20 min a 4 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q02185 3443 Srm—Alanina-aminotransferasa; c.cat.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 1 setmana a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q02166U 9039 Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].
(indica com conservar la mostra)

Q02466U 9086 Pla—Albúmina; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q02443 4269 LAs—Albúmina; c.massa(CRM 470)

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q02443U 9695 LAs—Albúmina; c.massa (urgent)

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q02444 7303 LCR—Albúmina; c.massa

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari i un cop transferit, conserveu la mostra a 4 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q02449U 9696 LPl—Albúmina; c.massa (urgent)

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q02485 3445 Srm—Albúmina; c.massa(CRM 470)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra Si es realitza la determinació en plasma, el millor anticoagulant és l'EDTA-Na2.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q02400 3414 Líquid—Albúmina; c.massa(CRM 470)

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q02258U 9003992 Uri—Albúmina / Creatinini; raó massa/subst. (urgent)

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q02258 3992 Uri—Albúmina / Creatinini; raó massa/subst.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q02566 3179 Pla—Aldosterona; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient És convenient que l'extracció es realitzi entre les 8:00 i les 9:00 hores. Els pacients han d'estar en dejú de 9 hores, i en repòs, estirats o almenys asseguts, mitja hora abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP:* *10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra També es pot utilitzar sèrum o plasma amb heparina, sempre que no es demani juntament amb la mesura de Pla—Renina; c.subst.arb.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 12 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari i congeleu

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q61685 3199 Pla—Aldosterona / Renina; raó subst./subst.arb

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q91285 7005 Srm—alfa 1-antitripsina (fenotip); tàxon

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Si s'ha d'enviar més d'una alíquota, transferiu el sèrum al recipient secundari; en cas contrari, envieu el recipient primari centrifugat. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada; Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 mes a ≤ -20°C; ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q03585 3911 Srm—alfa-Fetoproteïna; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8]. En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se plasma amb heparina de sodi i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q03400 3912 Líquid—alfa-Fetoproteïna; c.massa

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q02624 4301 Fae—alfa-1-antitripsina; c.massa

Tipus de mostra Femta **Volum mínim** 5 g

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 mesos a ≤□□ -20 °C
(indica com conservar la mostra)

N18440 4611 Prt(Lks)—Alfa-Galactosidasa A; cont.cat.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

N18540 4648 Prt(Lks)—Alfa-Glucosidasa àcida; cont.cat.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra No se puede solicitar las vísperas de festivos

Tractament de la mostra Cap. No centrifugar ni congelar

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q03945 3369 Líquid de diàlisi—Alumini; c.massa

Tipus de mostra Líquid de diàlisi **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a (2-8) ºC (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 7 dies refirgerada (2-8) °C; ≤ 30 dies congelada ≤ -20 °C
(indica com conservar la mostra)

Q03966 3375 Pla—Alumini; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Sarstedt tap taronja de 7,5 mL amb heparina liti traça de metall 15x92 mm *Codi SAP: 10000246*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada. (La centrifugació i posterior tractament de la mostra ho fan al laboratori subcontractat)

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q97158 4752 Uri—Alumini/Creatinini; raó massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 10 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies a (18-22) ºC; ≤ 15 dies a (2-8) ºC; ≤ 28 dies a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q62758 3740 Uri—Amfetamines; c.arb. (d-metamfetamina; immunoanàlisi; no urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Q62758U 9000 Uri—Amfetamines; c.arb. (d-metamfetamina; immunoanàlisi; urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q04285 4271 Srm—Amikacina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,25 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96], ≤ 24 hores a (2-8) ºC [96], ≤ 1 mes -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q04244 3788 LCR—Amikacina; c.massa

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores tapat a (15-25) ºC [7]; ≤ 48 hores tapat a (2-8) ºC [7]; ≤ 28 dies tapat a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q03343U 9931 LAs—alfa-Amilasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC en tub primari, tapat, centrifugat i exposat a la llum [41]
(Indica com conservar la mostra)

Q03343 3561 LAs—alfa-Amilasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8) ºC fins el moment del lliurament

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu
(Indica com conservar la mostra)

Q03300U 9933 Líquid—alfa-Amilasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC en tub primari, tapat, centrifugat i exposat a la llum [41]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q03300 3569 Líquid—alfa-Amilasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Q03349 3560 LPl—alfa-Amilasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2 - 8) ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q03349U 9932 LPl—alfa-Amilasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC en tub primari, tapat, centrifugat i exposat a la llum [41]
(indica com conservar la mostra)

Q03366U 9929 Pla—alfa-Amilasa; c.cat.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q03385 3554 Srm—alfa-Amilasa; c.cat.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (15-25) ºC [7]; ≤ 1 mes a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q03358U 9930 Uri—alfa-Amilasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC en tub primari, tapat, centrifugat i exposat a la llum [41]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q03358 3559 Uri—alfa-Amilasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim**

Preparació pacient El pacient, quan s'aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra més adequada és l'orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (20-20) ºC 323]; ≤ 10 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

N01266 4253 Pla—Aminoàcids; c.subst.arb.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient S'ha d'adjuntar al full de derivació, el motiu de la sol·licitud, orientació diagnòstica i informació clínica més rellevant.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra La petició ha d'anar acompanyada de les següents dades: orientació diagnòstica i/o motiu de la sol·licitud i un breu resum d'informació clínica.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari i congeleu immediatament. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 30 dies a (-16 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

N01258 4250 Uri—Aminoàcids

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient S'ha d'adjuntar al full de derivació, el motiu de la sol·licitud, orientació diagnòstica i informació clínica més rellevant.

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina recent. La petició ha d'anar acompanyada de les següents dades: orientació diagnòstica i/o motiu de la sol·licitud i un breu resum d'informació clínica.

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤20ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 mesos (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q00958 4701 Uri—5-Aminolevulinat / Creatinini; raó massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q04585 4550 Srm—Amitriptilina+nortriptilina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP:* *10010742*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q04666U 4254 Pla—Amoni; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Posar immediatament a (2-8) ºC

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu immediatament al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 3 hores plasma separat i conservat a (2-4) ºC [41]; ≤ 24 hores plasma separat i conservat a -20 ºC [41]

C15966 3762 Srm—Ampicil·lina; c.massa(HPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ 80 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 3 h a (15 - 30) ºC [7]; ≤ 12 h (2 - 8) ºC [39]; ≤ Indefinit a ≤ -80 ºC [7]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q04985 3664 Srm—Androstenediona; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 4 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Z02772 7010 Srm—Anti HLA Antígeno Aislado Luminex. PRA calculado (Post-Tx)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al recipient secundari. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a 4 ºC; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Z02572 7009 Srm—Anti HLA Cribaje Luminex (Post-Tx)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra refrigerada (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a 4 ºC; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A17085 7107 Srm—Anti-ANCA-elastasa; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores□□ a (2 – 8) ºC□□; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC□□; > 3 mesos a□□ ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C01466 1410 Pla—Anticoagulant lúpic; c.arb.(negatiu; dubtós; positiu)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient El pacient no ha de realitzar tractament amb anticoagulants orals. Si realitza tractament amb HBPM han de passar 12 hores des de la darrera administració.

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Doble centrifugació: 1a a 3 000 g durant 15 min i 2a a 3 000 g durant 10 min. Transferiu al recipient secundari.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a ≤ -20 ºC; > 1 setmana a -80 ºC
(Indica com conservar la mostra)

Y08172U 9310 Ers(San)—Anticòs antieritrocitari; c.arb. ("Coombs directe"; urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (2-8) ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Y08172 1935 Ers(San)—Anticòs antieritrocitari; c.arb. ("Coombs directe"; no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

C07366 2578 Pla—Anticòs contra el factor VIII de la coagulació; c.subst.arb.(“Bethesda”)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A11785 3533 Srm—Anticòs contra el receptor de tirotropina; c.subst.arb.(OMS NIBSC 90/672)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 7 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 mesos a ≤ mesos a (-25 a -15) ºC [7]. Congelar només un cop.

A16044 8940 LCR—Anticòs contra la glicoproteïna de mielina dels oligodendròcits (MOG); c.arb.(IFI en cèl·lules transfectades)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,01 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 14 dies a nevera (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A16085 8701 Srm—Anticòs contra la glicoproteïna de mielina dels oligodendròcits (MOG); c.arb.(IFI en cèl·lules transfectades)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºc
(indica com conservar la mostra)

A07785 3233 Anticòs contra la insulina(Srm)—Anticòs contra la insulina(unit a la insulina); fr.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22)ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22)°C; ≤ 28 dies a (2-8)°C; ≤ 28 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C09266 1232 Pla—Anticòs (IgG) anti-PF4 heparino depenent (CLIA); c.subst.arb

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana (2-8)ºC ó 2 meses a - 80 ºC [319]
(indica com conservar la mostra)

L80685 7362 Srm—Anticossos (IgG) anti-Aspergillus fumigatus; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L79585 7368 Srm—Anticossos (IgG) anti-Candida albicans; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

L69385 7373 Srm—Anticossos (IgG) anti-Colom; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L80385 7371 Srm—Anticossos (IgG) anti-Micropolispora faeni; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

L58585 7375 Srm—Anticossos (IgG) anti-Periquito; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A43085 7639 Srm—Anticossos(IgG) antireceptor de fosfolipasa A2; c.subst.arb.(ELISA)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 setmanes a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A01285 8083 Srm—Anticossos antiactina F; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Si s'ha d'enviar més d'una alíquota, transferiu el sèrum al recipient secundari; en cas contrari, envieu el recipient primari centrifugat. Conserveu a (2-8)ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A25385 7889 Srm—Anticossos anti-adalimumab; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a temperatura ambient [7]; ≤ 4 dies a (2-8) ºC [7]; > 4 diess a -20 ºC [7].
(indica com conservar la mostra)

C25966RR 1848 Pla—Anticossos anti-ADAMTS-13; c.arb.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Si es sol·licita juntament amb la magnitud Pla—ADAMTS-13 (activitat); fr.cat. (C15666), han de fer-se dues alíquotes de 0,5 mL cadascuna.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a (22-25) ºC; ≤ 14 dies a ≤ -20 C.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A01885 8880 Srm—Anticossos anti-C1q del complement; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A36785 8864 Srm—Anticossos anticitoplasma de cèl·lules de Purkinje tipus 1("anti-Yo"); c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A02985 7965 Srm—Anticossos anti-citosol hepàtic tipus 1 (LC1); c.arb.(IFI triple teixit)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada ≤ -20ºC fins el seu processament.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A03085 8928 Srm—Anticossos anticoclears; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-24) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A03385 7989 Srm—Anticossos anticol·lagen IV (hèlix α3) (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8)ºC; > 48 hores a ≤ -20ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A04685 7015000 Srm—Anticossos antiepidermis; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0.2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu 1 dia (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A23885 7027 Srm—Anticossos antifactor H; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necessiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A04885 7894 Srm—Anticossos antifactor intrínsec; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A05644 8499 LCR—Anticossos antiglutamat-descarboxilasa (GAD65); c.subst.arb.(ELISA)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A05685 8500 Srm—Anticossos antiglutamat-descarboxilasa (GAD65); c.subst.arb.(ELISA)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A53485 8921 Srm—Anticossos anti-glutation S-transferasa theta 1 (GSTT1) (cribratge; IFI); c.arb.(negatiu, positiu)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Y10372 1032 Pla—Anticossos antigranulocítics

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Condicions d'obtenció de la mostra S'han d'extreure 5 tubs d'EDTA K3 (T71-EDTA K3 9mL LILA (SUB BST)) i 1 tub de sèrum (T74-GEL 8,5 mL OCRE (SUB BST)).

Tractament de la mostra Centrifugueu el tub de sèrum a (2 000-2100) g durant 12 min a (15-25) ºC. Conserveu i envieu a temperatura ambient.
Amb els tubs d'EDTA K3 no s'ha de fer cap tractament. Conserveu i envieu a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1-2 dies a temperatura ambient o a 4ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A07285 7061 Srm—Anticossos antihistones; c.subst.arb.(ELISA)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A39785 8871 Srm—Anticossos anti-HMG-CoA reductasa; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 30 dies congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A07585 8506 Srm—Anticossos antitirosinfosfatasa (IA2 illots pancreàtics); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A52885 8922 Srm—Anticossos anti-trombospondina tipus 1 (THSD7A); c.arb.(negatiu, positiu)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 300 µL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 dies a (2-8)°C; ≤ 6 mesos a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A52185 7109 Srm—Anticossos anti-ustekinumab; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (18-24) °C; ≤ 8 dies a (2-8) °C; > 8 dies a ≤ -20 °C
(indica com conservar la mostra)

A07485IN 7020000 Srm—Anticossos antiillots pancreàtics; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A23785 7887 Srm—Anticossos antiinfliximab; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 4 dies a nevera (2-8) ºC; > 4 dies a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A14585 8079 Srm—Anticossos antiiodur-peroxidasa (TPO); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 dies a (20-25) ºC; ≤ 8 dies a (2-8) ºC ≤ 24 mesos a ≤ -20 ºC. Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A51985 8929 Srm—Anticossos anti-LRP4; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22)ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC; > 24 hores a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A20585 8867 Srm—Anticossos anti-Ma1; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 21 dies a (2-8)°C; ≤ 4 mesos a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A08285 7070 Srm—Anticossos antimicrosomes hepàtics i renals (antigen LKM 1); c.arb.(IFI)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu processament.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A09185 7642 Srm—Anticossos antimieloperoxidasa (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8)ºC; > 48 hores a ≤ -20ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A09385 7069 Srm—Anticossos antimitocondrials; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu processament.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

BE000037 8004 Srm—Anticossos (IgG) anti-MPO, anti-PR3 i anticol·lagen IV(hèlix alfa3); c.arb.(CLIA)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8)ºC; > 48 hores a ≤ -20ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A09585 7012 Srm—Anticossos antimúscul estriat; c.arb.(IFI)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A09685 7067 Srm—Anticossos antimúscul llis; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu processament.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A16785 7876 Srm—Anticossos anti-MuSK; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A03985 8003 Srm—Anticossos anti-DNA doble cadena; c.subst.arb.(quimioluminescència)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu processament.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A24685 8728 Srm—Anticossos anti-ENA (Cribratge) (Ro52, Ro60, La, RNP, Sm, Scl70, Jo1) (CLIA); c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

A04085 7059 Srm—Anticossos anti-nDNA; c.arb.(Crithidia luciliae)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu processament.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A01485 7087 Srm—Anticossos anti-ATPasa H+/K+; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada ≤ -20 ºC fins el seu processament.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A16485 7879 Srm—Anticossos anti-aquaporina 4 (NMO); c.arb.(IFI en cèl·lules transfectades)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A42085 8855 Srm—Anticossos anti-neuronals; c.arb.(dot blot); expressat per:

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana en nevera a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos en mostres congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A42044 8501 LCR—Anticossos anti-neuronals; c.arb.(dot blot); expressat per:

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana en nevera a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos en mostres congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A40385 8532 LCR—Anticossos antineuronals intracel.lulars (immnunohistoquímica)

Tipus de mostra LCR **Volum mínim** 2 Ml

Preparació pacient

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (18-24) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a (-20 / -80) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A40285 8854 Srm—Anticossos antineuronals intracel.lulars (immnunohistoquímica)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 48 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (18-24) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a (-20 / -80) ºc

(indica com conservar la mostra)

A10285 7060 Srm—Anticossos antinuclears i anticitoplasmàtics; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu processament.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A10385 8483 Srm—Anticossos antinucleosomes; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a -20ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 8 hores a temperatura ambient (15-25) ºC; ≤ 48 hores a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos en mostres congelades -20 ºC [7]

A10985 8544 Srm—Anticossos antipèptids citrul•linats; c.subs.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu processament (congelador MA-13).

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Y72772 1033 Pla—Anticossos antiplaquetaris

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari	Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10010742*
Recipient primari	Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329)	*Codi SAP:*	*10007915*
Recipient primari	Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036)	*Codi SAP:*	*10007903*
Recipient primari (alternatiu)	(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10006094*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient primari (alternatiu)	(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210)	*Codi SAP:*	*10014965*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014982*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP:*	*10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra S'han d'extreure 7 tubs d'EDTA K3 (T71-EDTA K3 9mL LILA (SUB BST)), 1 tub de citrat (T73-CITRAT 3,5 mL BLAU (SUB BST)) i 1 tub de sèrum (T74-GEL 8,5 mL OCRE (SUB BST)).

Tractament de la mostra Centrifugueu el tub de sèrum a (2 000-2100) g durant 12 min a (15-25) ºC. Conserveu i envieu a temperatura ambient.
Amb els tubs d'EDTA K3 i citrat no s'ha de fer cap tractament. Conserveu i envieu a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A52385 7011 Srm—Anticossos anti-proteïna de superfície neuronal ("IgLON5"); c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC; > 3 mesos -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

A32985 8482 Srm—Anticossos anti-proteïna P ribosomal (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu processament.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A11285 7645 Srm—Anticossos antiproteïnasa 3 (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8)ºC; > 48 hores a ≤ -20ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A11585 8511 Srm—Anticossos antireceptor d'acetilcolina; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A23985 8926 Srm—Anticossos anti-RNP (U1) (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8) ºC; > 48 hores a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A24185 8927 Srm—Anticossos anti-Sm (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8) ºC; > 48 hores a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A24485 8924 Srm—Anticossos anti-SS-A (Ro52) (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambient; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; > 14 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A34085 8923 Srm—Anticossos anti-SS-A (Ro60) (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambient; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; > 14 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A24385 8925 Srm—Anticossos anti-SS-B (La) (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambient; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; > 14 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A14285 7021 Srm—Anticossos antisuprarenals; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A14485 8082 Srm—Anticossos antitiroglobulina (TGB); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 4 dies a (20-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC. Congelar només un cop.

A52085 7893 Srm—Anticossos anti-vedolizumab; c.massa(CLIA)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 2 dies a temperatura ambient (18-25) ºC; ≤ 4 dies a nevera (2-8) ºC; > 4 dies a -20 ºC [7]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A02185 8866 Srm—Anticossos anti-canals de calci (VGCC); c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Si s'ha d'enviar més d'una alíquota, transferiu al recipient secundari i congeleu; en cas contrari, envieu el recipient primari centrifugat i congelat.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (2-4) ºC; ≤ 3 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q05785 4820 Srm—Antigen CA-72-4; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (4-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

S276CLIS 19580 Srm—Anticossos contra el virus de la immunodeficiència humana (1+2) i antígen p24 (CLIA); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	40 µL (vol mort: 1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Condicions d'obtenció de la mostra	NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.		
Tractament de la mostra	Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)	≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 4 setmanes a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.		

S265CLIS 19545 Srm—Anticossos contra Treponema pallidum (CLIA); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	10 µL (vol mort: 1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Condicions d'obtenció de la mostra	NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.		
Tractament de la mostra	Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)	≤ 6 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A52685 8914 Srm—Anticossos en encefalitis autoimmunitària; prop.arb.(IFI en cèl·lules transfectades)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana en nevera a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos en mostres congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

S064AGS 9701 Srm—Anticossos heteròfils contra el virus d'Epstein-Barr; c.arb. (aglutinació) (positiu, negatiu)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC; ≤ 8 dies a (2-8) ºC□ [7].
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Y01685 1937 Pla—Anticossos irregulars contra els eritròcits; c.arb. ("Coombs indirecte"; cribratge)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a 25 ºC [7]; ≤ 7 dies a (4-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Y73572 1938 Pla—Anticossos irregulars contra els eritròcits; c.arb. ("Coombs indirecte"; identificació)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a 25 ºC; ≤ 7 dies a (4-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A04185 7254 Srm—Anticossos(IgA) antiendomisi; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu processament.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A21785 8006 Srm—Anticossos(IgA) anti-MPO i anti-PR3; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A21385 7103 Srm—Anticossos(IgA) anti-Saccharomyces cerevisiae; c.subst.arb.(ELISA)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 Ml

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (4-8) ºC ; > 5 dies a ≤ -20ºC
(indica com conservar la mostra)

A14785 7101 Srm—Anticossos(IgA) antitransglutaminasa (proteïna-glutamina-gamma-glutamiltransferasa); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu processament (congelador MA-13).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC; ≤ 2-14 dies a (2-8) ºC; > 14 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A01585 7715 Srm—Anticossos(IgG) anti-beta2glicoproteïna I (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A02385 7896 Srm—Anticossos (IgG) anticardiolipina (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A02885 7106 Srm—Anticossos (IgG) anticitoplasma de neutròfils patró "xANCA" (malaltia inflamatòria intestinal); c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

K10785 8939 Srm—Anticossos (IgG) anti-Clostridium tetani (post-vacunació); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra ☐Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K10885 8938 Srm —Anticossos (IgG) anti-Clostridium tetani (pre-vacunació); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K08685 8935 Srm—Anticossos (IgG) anti-Haemophilus influenzae tipus B (post-vacunació); c.massa.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K03685 8934 Srm—Anticossos (IgG) anti-Haemophilus influenzae tipus B (pre-vacunació); c.massa.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

S235EIAS 8937 Srm—Anticossos (IgG) anti-Salmonella typhi Vi (post-vacunació); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

S234EIAS 8936 Srm—Anticossos (IgG) anti-Salmonella typhi Vi (pre-vacunació); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

S238CLIS 19130 Srm—Anticossos (IgG) contra Citomegalovirus (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 20 µL (vol mort: 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 4 setmanes a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

S256CLIS 19380 Srm—Anticossos (IgG) contra el virus de la rubèola (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 10 µL (vol mort: 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.

S080CLIS 19220 Srm—Anticossos (IgG) contra el virus Hepatitis A (CLIA); c.arb. (negatiu, proper a punt de tall, positiu)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 50 µL (vol mort: 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

S087CLIS 19270 Srm—Anticossos (IgG) contra el virus Hepatitis C (CLIA); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	50 µL (vol mort: 1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Condicions d'obtenció de la mostra	NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.		
Tractament de la mostra	Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)	≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.		

S083CLIS 19240 Srm—Anticossos (IgG) contra l'antígen de superfície virus Hepatitis B (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	40 µL (vol mort: 1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Condicions d'obtenció de la mostra	NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.		
Tractament de la mostra	Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)	≤ 3 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

S082EIAS 19235 Srm—Anticossos (IgG) contra l'antígen e virus Hepatitis B (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 40 µL (vol mort: 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra) ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 11 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.

S260CLIS 19535 Srm—Anticossos (IgG) contra Toxoplasma gondii (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 10 µL (vol mort: 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra) ≤ 3 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 3 setmanes a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

S084CLIS 19225 Srm—Anticossos (IgG+IgM) contra l'antigen del nucli virus Hepatitis B (CLIA); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 40 µL (vol mort: 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra) ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.

S240CLIS 19135 Srm—Anticossos (IgM) contra Citomegalovirus (CLIA); c.arb. (negatiu, dubtós, positiu)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 10 µL (vol mort: 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra) ≤ 7 dies a 25 ºC [7]; ≤ 4 setmanes a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

S081CLIS 19215 Srm—Anticossos (IgM) contra el virus Hepatitis A (CLIA); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	10 µL (vol mort: 1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Condicions d'obtenció de la mostra	NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.		
Tractament de la mostra	Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)	≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.		

S085CLIS 19230 Srm—Anticossos (IgM) contra l'antigen del nucli virus Hepatitis B (CLIA); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	10 µL (vol mort: 1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Condicions d'obtenció de la mostra	NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.		
Tractament de la mostra	Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)	≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

S262CLIS 19540 Srm—Anticossos (IgM) contra Toxoplasma gondii (CLIA); c.arb. (negatiu, dubtós, positiu)

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	10 µL (vol mort: 1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Condicions d'obtenció de la mostra	NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.		
Tractament de la mostra	Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)	≤ 3 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 21 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.		

A05885 8813 Srm—Anticossos(IgG) antidisialogangliòsid GD1a; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	
Preparació pacient			
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP:*	*10019563*
Condicions d'obtenció de la mostra			
Tractament de la mostra	Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)			

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A16644 8802 LCR—Anticossos(IgG) antidisialogangliòsid GD1a; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu
(Indica com conservar la mostra)

A05985 8815 Srm—Anticossos(IgG) antidisialogangliòsid GD1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP:* *10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu
(Indica com conservar la mostra)

A05844 8804 LCR—Anticossos(IgG) antidisialogangliòsid GD1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A04285 7255 Srm—Anticossos(IgG) antiendomisi; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu processament.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A05944 8806 LCR—Anticossos(IgG) antimonosialogangliòsid GM2; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A06185 8817 Srm—Anticossos(IgG) antimonosialogangliòsid GM2; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(Indica com conservar la mostra)

A21485 7104 Srm—Anticossos(IgG) anti-Saccharomyces cerevisiae; c.subst.arb.(ELISA)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (4-8) ºC ; ≤ 5 dies a ≤ -20ºC.
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K03785 7891 Srm—Anticossos (IgG) anti-Streptococcus pneumoniae (post-vacunació); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari i congeleu ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K08785 7890 Srm—Anticossos (IgG) anti-Streptococcus pneumoniae (pre-vacunació); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari i congeleu ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A06485 8819 Srm—Anticossos(IgG) antitrisialogangliòsid GT1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP:*	*10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(Indica com conservar la mostra)

A06144 8808 LCR—Anticossos(IgG) antitrisialogangliòsid GT1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari	Recipient subministrat per l'usuari	*Codi SAP:*	*--*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP:*	*10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A01685 7716 Srm—Anticossos (IgM) anti-beta2glicoproteïna I (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A02485 7666 Srm—Anticossos (IgM) anticardiolipina (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A19285 8814 Srm—Anticossos(IgM) antidisialogangliòsid GD1a; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(Indica com conservar la mostra)

A19944 8803 LCR—Anticossos(IgM) antidisialogangliòsid GD1a; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A19385 8816 Srm—Anticossos(IgM) antidisialogangliòsid GD1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari (alternatiu)	(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10006094*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm	*Codi SAP:*	*10014148*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP:*	*10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

A19244 8805 LCR—Anticossos(IgM) antidisialogangliòsid GD1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari	Recipient subministrat per l'usuari	*Codi SAP:*	*--*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP:*	*10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A08685 7877 Srm—Anticossos(IgM) antiglicoproteïna associada a la mielina (MAG); c.arb.(negatiu, positiu)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a nevera (2-8) ºC; > 5 dies en mostres congelades ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A19344 8807 LCR—Anticossos(IgM) antimonosialogangliòsid GM2; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

A19585 8818 Srm—Anticossos(IgM) antimonosialogangliòsid GM2; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A06385 8821 Srm—Anticossos(IgM) antitetrasialogangliòsid Gq1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP:*	*10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(Indica com conservar la mostra)

A19544 8809 LCR—Anticossos(IgM) antitrisialogangliòsid GT1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari	Recipient subministrat per l'usuari	*Codi SAP:*	*--*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP:*	*10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A19685 8820 Srm—Anticossos(IgM) antitrisialogangliòsid GT1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu
(Indica com conservar la mostra)

Q05066U 9099 Pla—Antidepressius tricíclics; c.arb. (nortriptilina; immunoanàlisi) (no tòxic, tòxic)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (15-25) ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

W34344 3927 LCR—Antigen CA-125; c.subst.arb.

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q05185 3905 Srm—Antigen CA-125; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se plasma amb heparina (liti, sodi) i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

W96100 3906 Líquid—Antigen CA-125; c.subst.arb.

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W34144 3928 LCR—Antigen CA-15-3; c.subst.arb.

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Q05285 3903 Srm—Antigen CA-15-3; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se plasma amb heparina (liti, sodi, amoni) i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q05200 3907 Líquid—Antigen CA-15-3; c.subst.arb.

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim**

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

W34244 3926 LCR—Antigen CA-19-9; c.subst.arb.

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Q05400 3904 Líquid—Antigen CA-19-9; c.subst.arb.

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q05485 3902 Srm—Antigen CA-19-9; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se plasma amb heparina (liti, sodi, amoni) i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

W34444 3929 LCR—Antigen carcinoembriogènic; c.massa

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (4-8) c [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q05800 3909 Líquid—Antigen carcinoembriogènic; c.massa

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q05885 3908 Srm—Antigen carcinoembriogènic; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se plasma amb EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q05985 4822 Srm—Antigen associat a carcinomes escamosos (SCC); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a 20 ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 °C [7]
(indica com conservar la mostra)

D025CLIS 19255 Srm—Antigen de superfície virus Hepatitis B (CLIA); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 50 µL (vol mort: 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

D024CLIS 19250 Srm—Antigen e virus Hepatitis B (CLIA); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 35 µL (vol mort: 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina liti.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 11 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7]. Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.
(indica com conservar la mostra)

W34544 3930 LCR—Antigen específic de la pròstata; c.massa

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7]

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q06285 3914 Srm—Antigen específic de la pròstata; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se plasma amb heparina de liti i EDTA tripotàssic.
L'obtenció de la mostra ha de ser abans de la palpació de la pròstata o 5 dies després.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q06185 3916 Srm—Antigen específic de la pròstata(no unit a proteïna); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se plasma amb heparina de sodi i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Z03072 1932 Lfs(San)—Antigen HLA-B27; c.arb. (0, 1)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP:* *10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 72 hores a temperatura ambient, segons un estudi realitzat a varit temps entre 0 i 6 díes. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

Y09672 1037 San—Antígens eritrocítics; tàxon (AB0, Rh; tipificació)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP:* *10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W11458 4265 Uri—Antimoni / Creatinini; raó massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina recent

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari. Si cal, Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 20 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W12266 3796 Pla—Antiretrovirals

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q02685 7004 Srm—alfa1-Antitripsina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.Transferiu a recipient secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra a -4 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (2 - 8)°C; > 48 hores a (- 20)°C
(indica com conservar la mostra)

G94211 4543 Array d'hibridació genòmica competitiva (CGH). Estudi postnatal

Tipus de mostra **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores (15-25) °C; ≥ 24 hores□□ (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C01666 1642 Pla—Antitrombina; c.subst.arb.(enz.)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

W31566 1648 Pla—Apixaban; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Nivells vall (administració del fàrmac 12hores abans de l'extracció).Nivells pic (entre 1-3h post ingesta del fàrmac).

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -80ºC. ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q06885 3395 Srm—Apolipoproteïna A-I; c.massa(OMS/IFCC SP1-01)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Q06985 3396 Srm—Apolipoproteïnes B; c.massa(OMS/IFCC SP3-07)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q07372 4263 San—Arsènic; c.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 28 dies a (2-8)°C; ≤ 28 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

Q07358 4264 Uri—Arsènic; c.massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina recent

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 14 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q07466 4290 Pla—Ascorbat; c.massa (Vitamina C)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra Preservar de la llum.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2000-2100)g durant 10 min a (18-22)°C, el mes aviat posible. Transferiu i preserveu de la llum. Conserveu a -20°C. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2h a (18-25) °C; ≤ 24h a (2-8) °C; ≤ 5 dies a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q94585 4506 Srm—Azatioprina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Presa de mostra 1-2 hores posttractament. Centrifugar, aliquatar i enviar congelat.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) °C; > 1 mes□□ a (-20) °C
(Indica com conservar la mostra)

Q07585 3441 Srm—Aspartat-aminotransferasa; c.cat.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q07566U 9308 Pla—Aspartat-aminotransferasa; c.cat.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

K08485 8563 Banda monoclonal (interferència per Daratumumab) (immunofixació)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC, Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2 - 8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a temperatura ambient; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºc
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K00285 8560 Estudi de bandes monoclonals en el sèrum (immunofixació)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.
D'altra banda, per als gels de 9 amb màscara dinàmica cal fer 2 dilucions de sèrum:
1)☐ 10µL de sèrum + 50 µL de diluent per a la IgG.
2)☐ 30µL de sèrum + 60 µL de diluent per a la IgA/M i cadenes lleugeres kappa y lambda.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a temperatura ambient; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K06685 8561 Estudi de bandes monoclonals en el sèrum (immunotipatge)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 10 dies a (2-8) ºC ; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC (abans de 8 h des de la seva extracció) [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K00159 8479 Estudi de bandes monoclonals en la orina (immunofixació)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Concentrar 10 vegades amb el concentrador Minicon (codi CSUB 10003631).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a temperatura ambient; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

Q07766U 9100 Pla—Barbiturats; c.arb. (secobarbital; immunoanàlisi) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP:* *10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [10]
(Indica com conservar la mostra)

H11740U 9057 San—Basòfils; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP:* *10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H11840U 9027 Lks(San)—Basòfils; fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

H11740 1189 San—Basòfils; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H11840 1188 Lks(San)—Basòfils; fr.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q07958 3741 Uri—Benzodiazepines; c.arb. (nordiazepam; immunoanàlisi; no urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q07966U 9101 Pla—Benzodiazepines; c.arb. (diazepam; immunoanàlisi; urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP:* *10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [10]
(indica com conservar la mostra)

Q07958U 9709 Uri—Benzodiazepines; c.arb. (nordiazepam; immunoanàlisi; urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim**

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* *--*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q08566U 9042 Pla—Bilirubina; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].

Q08500U 9154 Líquid—Bilirubina; c.subst.

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) —

Q08543 3405 LAs—Bilirubina; c.subst.

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q08543U 9703 LAs—Bilirubina; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q08585 3455 Srm—Bilirubina; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q08385 3456 Srm—Bilirubina(esterificada); c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 4 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]

Q08366U 9040 Pla—Bilirubina(esterificada); c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 12 hores a (15-25) ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q65885 4341 Srm—Biotina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal.
Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar congelada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22)ºC; ≤ 14 dies a ≤ -20°C
(Indica com conservar la mostra)

N01666 4017 Pla—Biotinidasa; c.cat.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (2-8) ºC; > 24 hores a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q08766 3376 San—Bismut; c.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 28 dies a (2-8)°C; ≤ 28 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

W60485 3949 Srm—Brivaracetam; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0, 25 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha de realitzar un extracció pre-dosi.
-☐Per a les mostres que s'obtenen al propi Hospital, una vegada arribin al laboratori, aquestes s'han de centrifugar, aliquotar i emmagatzemar a (2-8) ºc.
-☐Per a les mostres que es reben d'altres centres de salut, les mostres s'han de centrifugar prèviament, transportar-se a temperatura ambient (si triguen menys de 72 h en arribar al laboratori) o a (2-8) ºc (si triguen més de 72 h en arribar al laboratori) i, una vegada arribin al laboratori, s'han d'emmagatzemar a (2-8) ºc. [211]

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu el plasma a un recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K00585 7796 Srm—Cadena kappa (Ig)(lliure); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 mes a (2-8) ºC ; ≤ 1 any ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

K00785 7797 Srm—Cadena lambda (Ig)(lliure); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 21 dies a (2-8) ºC ; ≤ 1 any ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

NO en té 7798 Srm—Cadena kappa (Ig)(lliure) / Cadena lambda (Ig)(lliure); raó massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a (2-8) ºC ; ≤ 1 any ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q96558 4750 Uri—Cadmi/Creatinini; raó massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 10 mL

Preparació pacient —

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (18-22) ºC; ≤ 15 dies a (2-8) ºC; ≤ 28 dies a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

Q09666U 9043 Pla—Calci(II); c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q09385 3471 Srm—Calci(II); c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 8 mesos a ≤ -20 ºC [10]

Q09258 3994 Uri—Calci(II) / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 4 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 3 setmanes a ≤ -20 ºC [323]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q09585 3473 Srm—Calcidiol; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 4 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 24 setmanes a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Q09685 3483 Srm—Calcitonina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub BD tap transparent de 5mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10000724*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de conservar-se a 4ºC fins a la seva centrifugació.

Tractament de la mostra Poseu la mostra amb gel a (2-8) ºC des de la seva obtenció. Abans d'1 hora, centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 4 ºC. Congeleu el tub primari centrifugat.

Estabilitat de la magnitud ≤ 19 hores a (2-8) °C; ≤ 15 dies a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q09785 3484 Srm—Calcitriol; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10010742*
Recipient primari (alternatiu)	(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10006094*
Recipient primari (alternatiu)	(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210)	*Codi SAP: 10014965*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W01524 4340 Fae—Calprotectina; fr.massa

Tipus de mostra Femta **Volum mínim**

Preparació pacient —

Recipient primari	tubo Calex-Dispositivo de extracción Quickt-Prep B-CALEX-50	*Codi SAP: 10022498*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP: 10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP: 10002525*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP: 10002186*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: si no es disposa de recipient secundari, la mostra es pot conservar en fred en el primari. Hi ha recipients secundaris a la càmara freda d'Hormones.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (4-8) ºC (recipient primari); ≤ 2 mesos a ≤ (-10) ºC (extracte diluït i en recipient secundari)
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q09858 3743 Uri—Cannabinoids; c.arb. (11-nor-delta9-THC-9-COOH; immunoanàlisi; no urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

W41758U 9711 Uri—Cannabinoids; c.arb. (11-nor-delta9-THC-9-COOH; immunoanàlisi; urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

I01872 8704 Sang—Capacitat oxidativa de granulòcits (citometria); fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP:* *10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP:* *10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T809-Control HEP.Na 6 mL VERD (SUB).
NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q10185 3759 Srm—Carbamazepina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 dia a (4) ºC [10]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q10166U 9102 Pla—Carbamazepina; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [7]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q76675U 9119 Hb(San)—Carboxihemoglobina; fr.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 UI/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 UI/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP: 10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra També es pot obtenir l'espècimen en una xeringa estèril heparinitzada.

Tractament de la mostra S'ha de mantenir la mostra en gel, sense congelar.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (2-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

J01072 2499 San—Cariotip constitucional

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacutest tap verd de 4 Ml amb heparina de sodi 13X75 mm *Codi SAP: 10007907*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

L69785 8562 Basòfils (San)—CD63; c.arb. (0, 1) ("Test d'activació de basòfils")

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra No refrigereu

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W31766 3779 Srm—Cefepima; c.massa(HPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ 80 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 h (20 - 25) ºC; ≤ 24 h (2 - 8) ºC; ≤ 6 mesos (-72 - (-78)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)

W31885 3782 Srm—Ceftazidima; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra Refrigerat

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (20 - 25) °C; ≤ 48 hores a □(2 - 8) °C ; ≤ 3 mesos a □(-20) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W69885 3748 Pla—Ceftolozà; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ □4 h a temperatura ambient (15-25); ≤ 24 h a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC; ≥ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

H03372 2214 San—Cèl·lules; morfologia (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Vegeu el tipus de recipient i additiu en el document complementari "Magnituds per tub (DC024)" i la resta d'especificacions al document complementari "Obtenció, manipulació i preservació de la mostra (DC025)".

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H03372U 9008 San—Cèl·lules; morfologia (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Vegeu el tipus de recipient i additiu en el doALment complementari "Magnituds per tub (DC024)" i la resta d'especificacions CU document complementari "Obtenció, manipulació i preservació de la mostra (DC025)".

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K05285 7057 Srm—CD25 soluble (alL2R); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,6 mL

Preparació pacient —

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu (- 20) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 30 dies □□a (-80)º C
(indica com conservar la mostra)

I98372 7029 San—CD46 (%) (citometria) [nom provisional]; fr.nom

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (2-8) ºc
(indica com conservar la mostra)

Q28785 7001 Srm—Ceruloplasmina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC i transferiu a recipient secundari.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (2 - 8) ºC; ≤ 4 setmanes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q78785 5007 Srm—Cistatina C; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (15-25) ºc [7]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 24 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

W51272 3784 San—Ciclosporina; c.massa (UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q62372 3755 San—Ciclosporina; c.massa (als 120 min de la seva administració) (UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha de prendre la medicació 120 min abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

N14658 4274 Uri—Cistina / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina recent. En la petició s'ha d'indicar: orientació diagnòstica, motiu de la sol•licitud i la informació que es consideri rellevant.

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal.Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 10 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q10985 4552 Srm—Clobazam; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra ☐Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (18-22) ºC; ≤ 15 dies a (2-8) ºC; ≤ 180 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q11085 4554 Srm—Clomipramina+desmetilclomipramina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (18-22) ºC; ≤ 15 dies a (2-8) ºC; ≤ 180 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q10685 4824 Srm—Citoqueratina 19; c.massa.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies (18-22) ºC; ≤ 30 dies (2-8)°C; ≤ 60 dies (-20)°C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

I76472 7062 Sang—Citotoxicitat NK [CD3- CD16+ CD56+ (Lim-NK) (funció citotòxica) (citometria)]; c.arb

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 7 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T809-Control HEP.Na 6 mL VERD (SUB)
NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q11685 3169 Srm—Clorur; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [374]; > 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q11666U 9044 Pla—Clorur; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q11658 3978 Uri—Clorur; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra és recollida des de la UCI.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]; ≤1 any a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q11658U 9093 Uri—Clorur; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q60758 3990 Uri—Clorur / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(Indica com conservar la mostra)

Q11885 3767 Srm—Clozapina; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP:* *10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP:* *10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP:* *10014148*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP:* *10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció abans de la dosi del matí.
-Per a les mostres que s'obtenen al propi Hospital, centrifugueu-les, aliquoteu-les si pertoca i emmagatzemeu-les a (2-8) ºC.
-Per a les mostres que es reben d'altres centres de salut, aquestes es poden transportar a temperatura ambient si triguen menys de 3 dies en arribar al laboratori (inclús sense que aquestes hagin sigut centrifugades prèviament). Pel contrari, les mostres s'han de transportar a (2-8) ºC i protegides de la llum si triguen entre 3 i 7 dies en arribar al laboratori (inclús sense que aquestes hagin sigut centrifugades prèviament). Si les mostres arriben al laboratori sense centrifugar, centrifugueu-les i emmagatzemeu-les a (2-8) ºC. Si les mostres arriben centrifugades i aliquotades, emmagatzemeu-les directament a (2-8) ºC. [199]
-Es pot fer servir qualsevol tub de sèrum amb gel separador. Si es sol·liciten altres magnituds bioquímiques addicionals, es recomana fer una alíquota al RSA per evitar una altre punxada al pacient.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2100) g durant 10 min a (18-22)ºC. Transferiu al recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies□□ (15-30) ºC [7]; ≤ 1 setmana a □□(2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos□□ - 18 ºC [
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C01866 1794 Pla—Coagulació induïda per botroxobina("temps de reptilasa"); temps rel. expressat per:

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 1 setmana a -20 ºC; ≤ 1 mes a -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

C11266 1638 Pla—Coagulació induïda per factor tissular; temps("temps de protrombina"; IRP 67/40; no urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C02266U 9054 Pla—Coagulació induïda per factor tissular; INR("temps de protrombina"; IRP 67/40; urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC [114]
(Indica com conservar la mostra)

C02266 2207 Pla—Coagulació induïda per factor tissular; INR("temps de protrombina"; IRP 67/40; no urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim**

Preparació pacient —

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC [114]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C16166 2208 Pla—Coagulació induïda per factor tissular; INR(“temps de protrombina”; IRP 67/40; “TAO”; no urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim**

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

C02066U 9033 Pla—Coagulació induïda per factor tissular; temps rel.(“temps de protrombina”; IRP 67/40; urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C02066 1639 Pla—Coagulació induïda per factor tissular; temps rel.("temps de protrombina"; IRP 67/40; no urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

C02466 1795 Pla—Coagulació induïda per trombina; temps rel.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C14266 1813 Pla—Coagulació induïda per una superfície; temps("TTPA"; no urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

C02666U 9080 Pla—Coagulació induïda per una superfície; temps rel.("TTPA"; urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

C02666 1787 Pla—Coagulació induïda per una superfície; temps rel.("TTPA"; no urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C16366 1785 Pla—Coagulació induïda per una superfície; temps rel. (“TTPA”; “TAO”)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

Q11985 3549 Srm—Cobalamines; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores. En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra També es pot utilitzar plasma amb heparina de sodi o EDTA.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q12058 4334 Uri—Cobalt; c.massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP: 10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP: 10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP: 10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina recent, al final de la setmana laboral.

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 28 dies a (2-8)°C; ≤ 28 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

Q12072 4333 San—Cobalt; c.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Sang total (EDTA K3) al final de la jornada laboral.

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W41858 3781 Uri—Cocaïna+metabòlits; c.arb. (benzoilecgonina; immunoanàlisi; no urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient El pacient, quan s'aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra més adequada és l'orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 setmanes a (4-8) ºC (amb àcid ascòrbic i pH=5) [10]; ≤ 4 mesos a ≤ -20 ºC [10]

W41858U 9001 Uri—Cocaïna+metabòlits; c.arb. (benzoilecgonina; immunoanàlisi; urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* *--*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 setmanes a (4-8) ºC (amb àcid ascòrbic i pH=5) [10]; ≤ 4 mesos a ≤ -20 ºC [10]

Q13200 3415 Líquid—Colesterol; c.subst.

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP:* *10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) —

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q13285 3386 Srm—Colesterol; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]

Q13249 3413 LPl—Colesterol; c.subst.

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) —

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q13243 3404 LAs—Colesterol; c.subst.

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q12785 3387 Srm—Colesterol d'HDL; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 12 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q13185 3393 Srm—Colesterol de VLDL; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8]

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (20-25) ºC; ≤ 2 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q13385 3444 Srm—Colinesterasa; c.cat

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) °C; > 3 mesos a □□(-20) °C o (-80) °C
(indica com conservar la mostra)

K01785 7299 Srm—Complement C3; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (2-8) ºC; ≤ 8 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K01985 7300 Srm—Complement C4; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (2-8) ºC; ≤ 8 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K09666 7025 Pla—Complex d'atac a la membrana soluble (sC5b9); c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necessiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K01585 8978 Srm—Component C1q del complement; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q62185 3438 Srm—Component monoclonal; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 10 dies a (2-8) ºC [7]; ≤1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W68485 3167 Srm—Copeptina; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q13885 3750 Srm—Coriogonadotropina; c.subst.arb. (no urgent)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra També es pot utilitzar plasma amb heparina, EDTA, oxalat o citrat com a anticoagulants i també líquid cèfalo-raquidi.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q13866U 9700 Pla—Coriogonadotropina; c.subst.arb. (urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10].
(Indica com conservar la mostra)

Q13958U 9107 Uri—Coriogonadotropina; c.arb. (negatiu, positiu) (urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Es recomana utilitzar la primera orina del matí i fer la mesura AL més aviat possible.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Q13958 3749 Uri—Coriogonadotropina; c.arb. (negatiu, positiu) (no urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient El pacient, quan s'aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Es recomana utilitzar la primera orina del matí i fer la mesura al més aviat possible.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari. Descongeleu i atempereu els espècimens congelats abans de ser utilitzats. No és necessari filtrar o centrifugar els espècimens tèrbols o sanguinolents.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q14366 3288 Pla—Corticotropina; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores. El pacient ha de mantenir-se en repòs 30 minuts entre la punció i l'extracció de la sang.

Recipient primari Tub Vacuette tap rosa de 4 mL amb EDTA K3+aprotinina 13x75 mm *Codi SAP: 10000239*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de conservar-se a 4ºC fins a la seva centrifugació i mantenir-se a ≤ −20 ºC fins a la seva mesura.

Tractament de la mostra Poseu la mostra amb gel a (2-8) ºC des de la seva obtenció. Abans de 6 hores, centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 4 ºC. Separeu el plasma, transferiu al recipient secundari i congeleu immediatament [149].

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 setmanes a ≤ -20 ºC (amb aprotinina / mercaptoetanol) [10]
(Indica com conservar la mostra)

Q14585 3291 Srm—Cortisol; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores. El pacient ha de mantenir-se en repòs 30 minuts entre la punció i l'extracció de la sang.

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra Degut al ritme circadiari que té aquesta magnitud, i l'estrès originat en el procés d'extracció, l'hora de l'obtenció de l'espècimen ha de ser entre les 08:00 i 09:00 hores. L'extracció es realitza amb "papallona".

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]; ≤ 4 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q14785 3378 Srm—Coure(I+II); c.subst.(SRM 1950; Espectrometria d'absorció atòmica de flama)

Tipus de mostra Serum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Dejú de 8 h

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2 - 8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a □□(2 - 8) ºC□□□□; ≤ 1 any a□□ ≤ (-18) ºC [349]
(indica com conservar la mostra)

Q15066U 9046 Pla—Creatina-cinasa; c.cat.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra No es pot utilitzar citrat o fluorur, ja que inhibeixen l'activitat de l'enzim.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q15085 3425 Srm—Creatina-cinasa; c.cat.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra L'espècimen aconsellable és el sèrum, encara que es pot utilitzar plasma heparinitzat o amb EDTA (no s'ha d'utilitzar citrat o fluorur, ja que inhibeixen l'activitat de l'enzim).

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]

Q14966 9295 Pla—Creatina-cinasa 2; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,05 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (20-25) ºC

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [206]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q15185 3113 Srm—Creatinini; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]

Q15100 3410 Líquid—Creatinini; c.subst.

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) —

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q15148 4051 LPt(Diàlisi)—Creatinini; c.subst.

Tipus de mostra Líquid peritoneal **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) —

Q15166U 9049 Pla—Creatinini; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºc

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].

Q56085 5000 Srm—Cribratge Primer Trimestre de trisomies; prop.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient No necessita condicions especials. No dejú.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 1 setmana□.Transport amb refrigeració habituals evitant l'exposició de les mostres a temperatures elevades (mostres prop de la finestra o font de calor) [7]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q56185 5002 Srm—Coriogonadotropina (cadena beta lliure); c.subst.arb.

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	—
Preparació pacient	No necessita condicions especials.		
Recipient primari	Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10010742*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014632*
Recipient primari (alternatiu)	(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10006094*
Condicions d'obtenció de la mostra	Cap.		
Tractament de la mostra	Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min, a (18 - 22) ºC.		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)	≤ 25 hores a 15-25 °C; 8 dies a 2-8 °C; 12 mesos a -20 °C .Transport amb refrigeració habituals evitant l'exposició de les mostres a temperatures elevades (mostres prop de la finestra o font de calor) [7]		

Q15485 5100 Srm—Cribratge Segon Trimestre de trisomies i defectes tub neural; prop.arb.

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10010742*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014632*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a -20 ºC. Envieu la mostra congelada		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)	≤ 24 hores a (2-8) ºC; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Y02085 1013 Srm—Crioaglutinina; c.subst.arb. (0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient —

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive 16x100 mm (ref. 455001) *Codi SAP: 10014637*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra s'ha de conservar des de la seva extracció fins la realització de l'anàlisi a 37ºC. Per assegurar-vos d'aquest requisit, s'haurà d'utilitzar un envàs de transport de mostres a 37ºC pel transport i l'estufa a 37ºC, per la seva conservació.

Tractament de la mostra Deixeu la mostra a l'estufa a 37ºC durant mínim 1 hora fins que es produeix la retracció del coàgul, centrifugueu a 2 280 g durant 5 min a (18-22) ºC. Separeu el sèrum i guardeu-lo a la nevera.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a 37 ºC. (Conserveu la mostra a 37ºC des de l'extracció de la mostra fins la realització de l'anàlisis)
(indica com conservar la mostra)

K06585 8742 Srm—Crioglobulines; prop.arb. (immunofixació)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive 16x100 mm (ref. 455001) *Codi SAP: 10014637*

Condicions d'obtenció de la mostra Dins una estufa de 37 ºC a l'Àrea d'Immunologia hi ha contenidors amb "petaques" acumuladores que s'han de fer servir per transportar els tubs fins el laboratori. S'extreuen dos tubs de 9 mL sense additius, s'introdueixen a la petaca i es porten al laboratori. Un cop aquí, es posen a dintra una estufa a 37°C i es deixen coagular durant 1 hora. Després es centrifuga amb la centrífuga AP86 Programa 2 (4.000 r.p.m.- 10 min - 37 ºC). El sèrum obtingut del sobrenadant es traspassa a un tub de vidre de 25 mL de capacitat i fons cònic i es tapa amb parafilm. S'identifica aquest tub amb una etiqueta numèrica (amb el número de laboratori) i es retola sobre el tub la data i el volum total de sèrum obtingut (mínim 5 mL). A continuació es col·loca aquest tub a (2-8) ºC en la nevera de diferits.
NOTA: Per a anàlisis diferides, el tub secundari pot ser un tub de plàstic convencional, emmagatzemat en nevera (2-8) ºC.

Tractament de la mostra Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 dies a (2-8) ºC [105]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K02885 8509 Estudi de crioglobulines, compost de:

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive 16x100 mm (ref. 455001) *Codi SAP: 10014637*

Condicions d'obtenció de la mostra S'extreuen dos tubs de 9 mL cadascun (Tub Vacuette de 9 mL, de plàstic, sense additius) i es deixa coagular durant 1 hora dintra una estufa a 37°C. Aquest procés es realitza a l'Àrea d'Immunologia, on també es centrifuga amb la centrífuga MA04, a 4.000 r.p.m. i 37ºC durant 10 minuts.

Tractament de la mostra Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitud
(Indica com conservar la mostra)

Q15551 3601 LSi—Cristalls; tàxon

Tipus de mostra Líquid sinovial **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive 16x100 mm (ref. 455001) *Codi SAP: 10014637*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra s'obté per punció articular.
Una vegada recollida la mostra, posar immediatament a (2-8) ºC i mantenir refrigerada durant el seu transport i emmagatzematge.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q15685 4335 Srm—Crom; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8)ºC. Envieu la mostra refrigerada

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (2-8)°C; ≤ 45 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

Q15658 4336 Uri—Crom; c.massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina recent al final de la setmana laboral o al principi i final de la jornada laboral.

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada

Estabilitat de la magnitu ≤ 14 dies a (2-8)°C; ≤ 1 any a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K02785 7055 Srm—Crioglobulines; c.arb. (0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive 16x100 mm (ref. 455001) *Codi SAP: 10014637*

Condicions d'obtenció de la mostra S'extreuen dos tubs de 9 mL cadascun (Tub Vacuette de 9 mL, de plàstic, sense additius) i es deixa coagular durant 1 hora dintra una estufa a 37°C. Aquest procés es realitza a l'Àrea d'Immunologia, on també es centrifuga amb la centrífuga MA04, a 4.000 r.p.m. i 37ºC durant 10 minuts.
El sèrum obtingut del sobrenadant es traspassa a un tub de vidre de 25 mL de capacitat i fons cònic i es tapa amb parafilm. S'identifica aquest tub amb una etiqueta numèrica (amb el número de laboratori) i es retola sobre el tub la data i el volum total de sèrum obtingut (mínim 5 mL). A continuació es col·loca aquest tub a 4°C en la nevera MA30, en una gradeta marcada amb el nom "Crioglobulines".
NOTA: Per a anàlisis diferides, el tub secundari pot ser un tub de plàstic convencional, emmagatzemat en nevera (2-8) ºC.

Tractament de la mostra Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 dies a (2-8) ºC [105]
(indica com conservar la mostra)

Q96466 3594 Pla—Cromogranina A; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El plasma s'ha de separar de les cèl·lules abans d'una hora des de l'extracció de sang, i congelar-lo.En aquest procès, no cal posar el tub en fred, i mai s'ha de conservar a la nevera (2-8 ºC). NOTA: La Cromogranina A en sèrum és més inestable que en plasma.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a temperatura ambient (15-25) ºC [7] i ≤ -20 ºC fins el seu anàlisi.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W32366 1647 Pla—Dabigatran; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Nivells vall (administració del fàrmac 12 hores abans de l'extracció).Nivells pic (a les 2h de prendre el fàrmac).

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -80 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(Indica com conservar la mostra)

W32266 4786 Srm—Daptomicina; c.massa(HPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2 - 8) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ 80 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 h a (15 - 30) ºC [7]; ≤ 12 h (2 - 8) ºC [39]; ≤ Indefinit a ≤ -80 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE12811 4762 DNA(San)—Depleció d'ADN mitocondrial tipus 4A (gen POLG)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (Temperatura ambient)□□; ≤ 4 dies a (2 - 8) °C
(Indica com conservar la mostra)

GE12711 4761 DNA(San)—Depleció d'ADN mitocondrial tipus 4A (gen POLG)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (Temperatura ambient)□□; ≤ 4 dies a (2 - 8) °C
(Indica com conservar la mostra)

GE17011 4361 Estudi genètic en els defectes del manteniment DNA mitocondrial (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies a (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE16911 4360 Estudi genètic en els defectes del manteniment DNA mitocondrial (NGS) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Q51572 3551 San—Difosfat de tiamina("Vitamina B1"); c.subst.(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú [7], [183]

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Protegir de la llum.

Tractament de la mostra Preserveu de la llum i conserveu a (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a temperatura ambient i protegida de la llum [7]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC i protegida de la llum [7]; ≤ 6 mesos a -20 ºC i protegida de la llum [183]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q17585 3765 Srm—Digoxina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de la mostra ha de ser al menys 6 hores després de l'administració del fàrmac (estat estacionari).

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96]; ≤ 24 hores a (4) ºC [96]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q17566U 9096 Pla—Digoxina; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de l'espècimen ha de ser AL menys 6 hores després de l'administració del fàrmac (estat estacionari).

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum; ≤ 3 mesos a (4-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C03666U 9268 Pla—Dímer D de la fibrina; c.massa (immunoquímica; urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 4,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC [115]
(indica com conservar la mostra)

C03666 1644 Pla—Dímer D de la fibrina; c.massa (immunoquímica; no urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim**

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q71173U 9130 Gas(aSan)—Diòxid de carboni; pr.parc.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP: 10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardar-lo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 60 minuts a (0-25) ºC [221]
(indica com conservar la mostra)

Q71175U 9131 Gas(vSan)—Diòxid de carboni; pr.parc.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP: 10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardar-lo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 60 minuts a (0-25) ºC [221]
(indica com conservar la mostra)

W15358U 9715 Uri—Drogues d'abús; c.arb. (urgent), expressat per:

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C16866 1641 Pla—□ Edoxaban; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Nivells vall (administració del fàrmac 12hores abans de l'extracció).Nivells pic (entre 1-3h post ingesta del fàrmac).

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -80ºC. ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC.
(Indica com conservar la mostra)

Q18024 4348 Fae—Elastasa pancreàtica 1; fr.massa

Tipus de mostra Femta **Volum mínim** 1 g

Preparació pacient

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (2-8)°C; ≤ 30 dies a ≤ -20°C.
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q31085 3429 Srm—Enolasa neuronal específica; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC., abans de transcorreguda 1 hora després de l'obtenció de la mostra.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) Estable durant 2 dies a 20-25 °C, 5 dies a 2-8 °C, 3 mesos a-20 °C (± 5 °C). Congelar només una vegada.

Q18248 4840 LPt—Entitats cel·lulars; prop.arb. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid Peritoneal **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ☐≤ 1 hora a (15-25) ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q18248U 9934 LPt—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra Líquid Peritoneal **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitu ☐≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18243 2864 LAs—Entitats cel·lulars; prop.arb. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Un cop mesurat el Líquid—Leucòcits; c.nom, centrifugueu a 1 300 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q18243U 9052 LAs—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18244U 9011 LCR—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q18200 2512 Líquid—Entitats cel·lulars; prop.arb. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Un cop mesurat el Líquid—Leucòcits; c.nom, centrifugueu a 1 300 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18200U 9012 Líquid—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q18247 2601 LPe—Entitats cel·lulars; prop.arb. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid pericàrdic **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Un cop mesurat el Líquid—Leucòcits; c.nom, centrifugueu a 1 300 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18247U 9277 LPe—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra Líquid pericàrdic **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q18249 2610 LPI—Entitats cel·lulars; prop.arb. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Un cop mesurat el Líquid—Leucòcits; c.nom, centrifugueu a 1 300 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18249U 9053 LPI—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q18251 2700 LSi—Entitats cel·lulars; prop.arb. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid sinovial **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Artrocentesi

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC; ≤ 24 hores a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18251U 9270 LSi—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra Líquid sinovial **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Artrocentesi

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC; ≤ 24 hores a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

H03372 2347 San—Entitats leucocítiques; fr.nom. ("fórmula leucocitària"; microscopia; no urgent), expressat per:

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H03372U 9227 San—Entitats leucocítiques; fr.nom. (“fórmula leucocitària”; microscopia; urgent), expressat per:

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Q18558 3110 Uri—Entitats microscòpiques ("sediment"; microscopia; recompte automatitzat; no urgent), expressat per:

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Es recomana recollir la segona micció del matí, ja que l’emmagatzematje vesical perllongat de la primera orina determina la disolució d’alguns dels seus components. Es recull la orina de la porció intermitja de la micció en un recipient net (pot estèril de polipropilé de 100 mL). En l’àrea de recollida d’orines es travassa al tub secundari (tub de poliestirè cònic de 16 x 100 mm graduat de 10 mL).

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 h a temperatura ambient [85] i ≤ 1 dia a 4ªC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q18558U 9144 Uri—Entitats microscòpiques ("sediment"; microscopia; recompte automatitzat; urgent), expressat per:

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient Es recomana recollir la segona micció del matí, ja que l'emmagatzematge vesicAL perllongat de la primera orina determina la dissolució d'alguns dels seus components. Es recull la orina de la porció intermitja de la micció en un recipient net (tub estèril de polipropilé de 100 mL) i es trasvassa a un tub de poliestirè cònic de 16 x 100 mm graduat de 10 mL. Al LU, es rep el tub de poliestirè cònic de 10 mL.

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 hores a temperatura ambient [85]
(indica com conservar la mostra)

Q20108 3374 CUr—Entitats moleculars; tàxon

Tipus de mostra Càlcul urinari **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Condicions d'obtenció de la mostra Càlcul en pot sec, sense orina.

Tractament de la mostra Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 mes a (18 a 22) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q18958 3021 Uri—Entitats moleculars; prop.arb. ("tira reactiva"), expressat per:

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient Es recomana que el pacient abans de fer la recollida de la orina es renti les mans i es netegi els genitals externs. Quan es recull l'orina s'ha d'evitar tocar amb les mans o genitals la superfície interna del contenidor, separant els llavis de la vulva en les dones i retraient el prepuci en els homes. S'ha de recollir en el contenidor la porció mitja de la micció, rebutjant la primera i la última porció d'orina excretada.

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra més adequada és l'orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra Transferiu a recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (2-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

H11540U 9063 San—Eosinòfils; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H11640U 9026 Lks(San)—Eosinòfils; fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

H11540 1187 San—Eosinòfils; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H11640 1186 Lks(San)—Eosinòfils; fr.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q19273U 9142 aSan—"Equilibri acidobàsic", expressat per:

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 UI/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 UI/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP: 10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra Cap. Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardar-lo a una temperatura de (2-8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 minuts a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q19275U 9143 vSan—"Equilibri acidobàsic", expressat per:

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 UI/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 UI/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP: 10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra Cap. Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardar-lo a una temperatura de (2-8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 minuts a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H10272 1157 San—Eritròcits; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10272U 9020 San—Eritròcits; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H10349U 9204 LPl—Eritròcits; fr.vol.("hematòcrit")

Tipus de mostra Líquid pleurAL **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari	Recipient subministrat per l'usuari	*Codi SAP:*	--
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP:*	*10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10372U 9111 San—Eritròcits; fr.vol.("hematòcrit"; urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H10372 1053 San—Eritròcits; fr.vol.("hematòcrit"; no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H14572U 9007 San—Eritròcits; morfologia (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10472U 9021 San—Eritròcits; vol.entític ("VCM"; urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H10472 1159 San—Eritròcits; vol.entític ("VCM"; no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

W12858 3125 Uri—Eritròcits dismòrfics; fr.nom. (sediment; microscopia)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 10 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Es recomana recollir la segona micció del matí, ja que l'emmagatzematge vesical perllongat de la primera orina determina la disolució d'alguns dels seus components. Es recull l'orina de la porció intermitja de la micció en un recipient net (habitualment, flascó estèril de polipropilé de 100 mL).

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari i centrifugueu a 1 500 rpm durant 5 minuts a 25 ºC (centrífuga BI06 de la secció BII).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 h a temperatura ambient [85] i < 1 dia a 4ªC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q19485 3858 Srm—Eritropoetina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

H03472U 9010 San—Eritrosedimentació; long (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (4-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H03472 1005 San—Eritrosedimentació; long (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (4-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W58185 3946 Srm— Ertapenem; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Refrigerat

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (20 - 25) °C; ≤ 48 hores a □(2 - 8) °C ; ≤ 3 mesos a □(-20) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W32485 4504 Srm—Eslicarbazepina+R-Licarbazepina; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari	Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10010742*
Recipient primari	(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10016363*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm	*Codi SAP: 10014148*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm	*Codi SAP: 10014632*
Recipient primari (alternatiu)	(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10006094*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha de realitzar un extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a les anàlisis de rutina. A més, per estalviar una punxada addicional innecessària al pacient, es recomana que es faci una alíquota al RSA sempre i quan, a més d'aquesta magnitud farmacològica, és mesurin altres magnituds bioquímiques.
-Per a les mostres que s'obtenen al propi Hospital, una vegada arribin al laboratori, aquestes s'han de centrifugar, aliquotar i emmagatzemar a (2-8) ºC.
-Per a les mostres que es reben d'altres centres de salut, les mostres s'han de centrifugar prèviament, transportar-se a temperatura ambient (si triguen menys de 72 h en arribar al laboratori) o a (2-8) ºC (si triguen més de 72 h en arribar al laboratori) i, una vegada arribin al laboratori, s'han d'emmagatzemar a (2-8) ºC. [211]

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q18184 3026 Sem—Espermograma (estudi de vasectomia)

Tipus de mostra Semen **Volum mínim** —

Preparació pacient El pacient ha de esperar el temps després de la intervenció que l'indiqui el seu uròleg així com les ejaculacions necessàries.

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Condicions d'obtenció de la mostra
- Mostra de semen recollida per masturbació en pot de plàstic, identificada i deixada en estufa a 37 °C. La mateixa mostra permet efectuar el recompte i la mobilitat en el cas que fos necessari.
- El pacient pot obtenir la mostra al seu domicili o bé a l'hospital a una estància destinada per aquest fi. En qualsevol cas, una vegada obtinguda la mostra s'ha de lliurar al Laboratori Clínic en un temps màxim de 1 hora. Els contenidors de recollida han de mantenir-se propers al cos per tal de garantir una temperatura propera a 37 °C. El pacient ha de portar la seva mostra a l'àrea de recepció de mostres i ha d'identificar-se. Tot això ha de fer-se davant del pacient i ell ha de signar el qüestionari.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q20384 3025 Sem—Espermograma (estudi de fertilitat)

Tipus de mostra Semen **Volum mínim** —

Preparació pacient Les guies clíniques actuals recomanen un periode d'abstinència sexual entre 2 i 7 dies. Una vegada el pacient porti la mostra al Laboratori ha d'omplir unes dades en format qüestionari que se'l lliurarà.

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Condicions d'obtenció de la mostra - La recollida de la mostra ha de fer-se per masturbació per tal d'evitar que es contamini la mostra, que es perdi una fracció de la mateixa o que es vegi afectada a la motilitat dels espermatozoides per canvis al pH de la mostra.
- El pacient pot obtenir la mostra al seu domicili o bé a l'hospital a una estància destinada per aquest fi. En qualsevol cas, una vegada obtinguda la mostra s'ha de lliurar al Laboratori Clínic en un temps màxim de 1 hora. Els contenidors de recollida han de mantenir-se propers al cos per tal de garantir una temperatura propera a 37 °C. El pacient ha de portar la seva mostra al Laboratori (CER) i ha d'identificar-se. La mostra haurà de lliurar-se juntament amb un imprès que el pacient rebrà on consten: les dades demogràfics del pacient, termini d'abstinència ejaculatòria, si la recollida es completa, l'hora de ejaculació, l'hora de lliurament al Laboratori, el motiu de la sol.licitud, si pateix alguna malaltia, si pren tractaments i quins son i si consumeix drogues, o alcohol. La mostra ha d'identificar-se amb les dades demogràfiques del pacient, i al moment de la recepció s'etiquetarà amb el nombre d'identificació del laboratori al tap i al contenidor. Tot això ha de amb el pacient i ell ha de signar el qüestionari.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) 1 hora. Si el temps d'estabilitat entre l'obtenció de la mostra i el lliurament al Laboratori supera aquest temps es farà constar a l'informe del Laboratori.

Q79072 4260 San—Estany; c.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 14 dies a (2-8)°C; ≤ 6 mesos a ≤ -20°C.

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q19785 3706 Srm—Estradiol-17ß; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a (-25 a -15) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A52644 8908 LCR—Anticossos en encefalitis autoimmunitària; prop.arb.(IFI en cèl·lules transfectades)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana en nevera a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos en mostres congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A42185 8881 Estudi d'anticossos en l'esclerodèrmia

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 º C fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A41085 8882 Estudi d'anticossos en miositis autoimmunitàries

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 º C fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A41385 7071 Estudi d'autoanticossos en hepatopaties autoimmunitàries

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 º C fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; 6 mesos en mostres congelades -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

GG87011 1025 Estudi de les hemoglobinopaties de cadena beta (gen HBB) (cas índex)

Tipus de mostra **Volum mínim** 9 ml

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia (15-25) °C; ≤ 3 dies □(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GG87111 1027 Estudi de les hemoglobinopaties de cadena beta (gen HBB] (cas familiar)

Tipus de mostra **Volum mínim** 9 Ml

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia (15-25) °C; ≤ 3 dies □(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG03311 4396 Estudi genètic en arrítmies (gens AKAP9, ANK2, CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, CASQ2, CAV3, CPT1A, DES, DSC2, DSG2, DSP, GJA5, GPD1L, GYG1, HCN4, JUP, KCNA5, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNH2, KCNJ2, KCNJ8, KCNQ1, LMNA, altres) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG03211 4395 Estudi genètic en arrítmies (gens AKAP9, ANK2, CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, CASQ2, CAV3, CPT1A, DES, DSC2, DSG2, DSP, GJA5, GPD1L, GYG1, HCN4, JUP, KCNA5, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNH2, KCNJ2, KCNJ8, KCNQ1, LMNA, altres) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q02672 4430 Estudi genètic en el dèficit de alfa-1-antitripsina (PCR)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** Sèrum: 1 mL

Preparació pacient Dejú de 8 hores

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra SÈRUM: Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC Transferiu a recipient secundari (10019563) i refrigereu (2 - 8) ºC
SANG: Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) Sèrum: ≤ 5 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a -20 ºC.
Sang: ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (2-8) ºC;

G31111 4289 Estudi genètic en el feocromocitoma i paraganglioma (gen SDHB)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra Adjuntar HC

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G99811 4328 Estudi genètic en l'atàxia episòdica (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Adjuntar HC i antecedents familiars

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-24) ºC; ≤ 2 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

G99711 4327 Estudi genètic en l'atàxia episòdica (gens CACNA1A, CACNB4, KCNA1, SLC1A3) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra Adjuntar HC i antecedents familiars

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-24) ºC; ≤ 2 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

GG64411 4372 Estudi genètic en el pseudohipoparatiroïdisme (gen GNAS) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G46711 4371 Estudi genètic en el pseudohipoparatiroïdisme (gen GNAS) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G00211 4276 Estudi genètic en l'adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X (ABCD1)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Adjuntar HC

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC; ≤ 2 dies a (18-22) ºC
(indica com conservar la mostra)

G75811 4425 Estudi del DNA en la demència frontotemporal (gen GRN) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G39711 4424 Estudi genètic en la demència frontotemporal (gen GRN) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

G76711 4427 Estudi genètic en la paràlisi supranuclear (gen MAPT) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

G40911 4426 Estudi genètic en la paràlisi supranuclear (gen MAPT) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN00211 3896 Estudi genètic en la diabetis mel·litus (MODY 2)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra Adjuntar HC

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G08711 3897 Estudi genètic en la diabetis mel·litus (MODY 3)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra Adjuntar HC

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G28511 3898 Estudi genètic en la distonia de torsió (gen DYT1)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

PRRT2F 4387 Estudi genètic en la distonia paroxística cinesogènica (gen PRRT2) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE84311 4386 Estudi genètic en la distonia paroxística cinesogènica (gen PRRT2) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG19911 4379 Estudi genètic de la distonia mioclònica (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC

(indica com conservar la mostra)

GG20011 4378 Estudi genètic de la distonia mioclònica (panell) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG21811 4524 Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GG20311 4523 Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) (panell) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG20411 4520 Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) 1C (gen CAV3) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GN03911 4522 Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) dominant (gens MYOT, CAV3, LMNA, DES) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE87911 4521 Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) dominant (gens MYOT, CAV3, LMNA, DES) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

G54411 4437 Estudi genètic en la distròfia de cintura (LGMD) 2B (gen DYSF) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G54311 4436 Estudi genètic en la distròfia de cintura (LGMD) 2B (gen DYSF) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G31511 3892 Estudi genètic de la distròfia de la cintura (LGMD) 1C (gen CAV3) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G09111 3860 Estudi genètic en la distròfia facioescapulohumeral tipus 1 (reordenament D4Z4 en 4q35)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 20 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE69711 4401 Estudi genètic en la distròfia facioescapulohumeral tipus 2 (gen SMCHD1) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE69811 4400 Estudi genètic en la distròfia facioescapulohumeral tipus 2 (gen SMCHD1) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G09211 4293 Estudi genètic en la distròfia miotònica de Steinert (DM1)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G09311 4292 Estudi genètic en la distròfia miotònica PROMM (DM2)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G10211 4275 Estudi genèticen la febre mediterrània familiar

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de venir acompanyada del qüestionari corresponent.

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G16311 3880 Estudi genètic de la fibrosi quística (gen CFTR-mutacions prevalents-)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE84511 4385 Estudi genètic en la glucogenosi tipus IV (gen GBE1) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE84611 4384 Estudi genètic en la glucogenosi tipus IV (gen GBE1) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

G48011 4345 Estudi genètic en la immunodeficiència primària (gen AIRE)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient No dejú.

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

GE85011 4412 Estudi genètic en la malaltia de Nieman Pick A i B (gen SMPD1) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE85111 4411 Estudi genètic en la malaltia de Nieman Pick A i B (gen SMPD1) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE08611 4415 Estudi genètic en la malaltia de Crouzon (gen FGFR2, exons 8 i 10) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE88811 3886 Estudi genètic de la malaltia de Parkinson (panell) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN05611 4646 Estudi genètic de la malaltia de Parkinson (panell) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G14111 3863 Estudi genètic en la malaltia de von Hippel-Lindau

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G22411 2905 Estudi genètic de la malaltia de von Willebrand (mutacions prevalents)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22)°C; ≤ 3 dies a (2-8)°C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG77211 2904 Estudi genètic en la malaltia de von Willebrand (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22)°C; ≤ 3 dies a (2-8)°C
(indica com conservar la mostra)

GE84811 4381 Estudi genètic en la malaltia venooclusiva pulmonar (gen EIF2AK4) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-22) ºc
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE84911 4380 Estudi genètic en la malaltia venooclusiva pulmonar (gen EIF2AK4) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-22) ºc
(Indica com conservar la mostra)

G75511 4366 Estudi genètic en la malatia d'Alzheimer (gen APP) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

G39411 4365 Estudi genèticen la malatia d'Alzheimer (gen APP) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G75611 4368 Estudi genètic en la malatia d'Alzheimer (gen PSEN1) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

G39511 4367 Estudi genètic en la malatia d'Alzheimer (gen PSEN1) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

G75711 4370 Estudi genètic en la malatia d'Alzheimer (gen PSEN2) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G39611 4369 Estudi genètic en la malatia d'Alzheimer (gen PSEN2) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG53711 4363 Estudi genètic en la malatia de Niemann-Pick C (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G14411 4362 Estudi genètic en la malatia de Niemann-Pick C (NPC1) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE65311 4439 Estudi genètic en la miastènia congènita (panell NGS)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

GE27411 4438 Estudi genètic en la miastènia congènita (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

GG47911 4391 Estudi genètic en la miocardiopatia dilatada (gens LMNA, MYBPC3, MYH7, SCN5A, TNNI3, TNNT2, altres) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG78811 4392 Estudi genètic en la miocardiopatia dilatada (gens LMNA, MYBPC3, MYH7, SCN5A, TNNI3, TNNT2, altres) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG48311 4394 Estudi genètic en la miocardiopatia hipertròfica (gens ACTC1, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, altres) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG48411 4393 Estudi genètic en la miocardiopatia hipertròfica (gens ACTC1, MYBPC3, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, altres) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE27011 4478 Estudi genètic en la miopatia distal de Laing (gen MYH7) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 4 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE26911 4477 Estudi genètic en la miopatia distal de Laing (gen MYH7) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 4 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G16611 3883 Estudi genètic en la neoplàsia endocrina múltiple tipus I

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra Adjuntar HC

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G16511 3864 Estudi genètic en la neoplàsia endocrina múltiple tipus II

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra Adjuntar HC

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G16911 3890 Estudi genètic en la neurofibromatosi tipus I (NF1)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G17011 3879 Estudi genètic en la neurofibromatosi tipus II (NFII)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE32111 4419 Estudi genètic en la pancreatitis crònica hereditària (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.Conserveu i si es sang envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada).

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 2 dies a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a 4 ºC.
(indica com conservar la mostra) DNA: ≤ 7 dies a (15-25) ºC o ≤ 4 dies a 4 ºC; ≤ 7 dies a -20 ºC.

GE32011 4418 Estudi genètic en la pancreatitis crònica hereditària (panell NGS) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.Conserveu i si es sang envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada).

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 2 dies a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a 4 ºC.
(indica com conservar la mostra) DNA: ≤ 7 dies a (15-25) ºC o ≤ 4 dies a 4 ºC; ≤ 7 dies a -20 ºC.

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG58311 449000 Estudi genètic en la paraparèsia espàstica (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

G92611 4531 Estudi genètic de la patologia vascular aneurismàtica (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G93011 4390 Estudi genètic de la patologia vascular aneurismàtica (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra Recepció de la mostra al laboratori extern de dilluns a dijous de 8:00 a 17:00h.

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 30 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN29511 4533 Estudi genètic de la síndrome CANVAS (gen RFC1) (estudi expansió)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies□□ a (2-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra) □□DNA: ≤ 1 any□□ en solució a (-20) ºC [10]

GE73811 4756 Estudi genètic de la síndrome d'Axenfeld-Rieger (gen FOXC1)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (Temperatura ambient)□□; ≤ 4 dies a (2 - 8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE88611 4484 Estudi genètic en la síndrome d'Ehlers-Danlos (panell NGS) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE73911 4755 Estudi genètic de la síndrome d'Axenfeld-Rieger (gen FOXC1)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (Temperatura ambient)□□; ≤ 4 dies a (2 - 8) °C
(Indica com conservar la mostra)

GG88511 4483 Estudi genètic en la síndrome d'Ehlers-Danlos (panell NGS) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies□□ a (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

GE53411 4758 Estudi genètic de la síndrome d'Axenfeld-Rieger (gen PITX2) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE53311 4757 Estudi genètic de la síndrome d'Axenfeld-Rieger (gen PITX2) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE55385 4785 Estudi genètic de la síndrome de Cowden (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE55485 4784 Estudi genètic de la síndrome de Cowden (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE27511 4595 Estudi genètic de la síndrome de Gilbert (gen UGT1A1)(detecció al·lel promotor)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a □(15-25) °C; ≤ 4 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE58485 4642 Estudi genètic de la resistència a les hormones tiroidees (gen THRB)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 Ml

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dia (15-25) °C ; ≤ 4 dies (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE72911 4643 Estudi genètic de la resistència a les hormones tiroidees (gen THRB)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dia (15-25) °C ; ≤ 4 dies (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG54611 4625 Estudi genètic de la síndrome de Noonan (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 4 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)

GE05611 4624 Estudi genètic de la síndrome de Noonan (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 4 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)

G61511 4538 Estudi genètic de la síndrome de Prader-Willi (MLPA metil·lació)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G30211 4347 Estudi genètic en la síndrome de Dravet (gen SCN1A)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 6 mL

Preparació pacient No dejú

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

GG38411 4374 Estudi genètic en la síndrome de Joubert (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

G45111 4373 Estudi genètic en la síndrome de Joubert (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G67411 4350 Estudi genètic en la síndrome de Kallman (gen KAL1) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient No dejú

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 4 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)

G67311 4349 Estudi genètic en la síndrome de Kallman (gen KAL1) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient No dejú

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 4 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE69911 4405 Estudi genètic en la síndrome de Lafora (gens EPM2A, NHLRC1) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 30 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE70011 4404 Estudi genètic en la síndrome de Lafora (gens EPM2A, NHLRC1) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 30 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G71811 4403 Estudi genètic en la síndrome de Marfan (gen FBN1) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

G29411 4402 Estudi genètic en la síndrome de Marfan (gen FBN1) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

GE85211 4389 Estudi genètic en la síndrome de PAPA(artritis piògena, pioderma gangrenoso y acne)(gen PSTPIP1) (cas familiar) (Sang)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient No dejú

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºc
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE85311 4388 Estudi genètic en la síndrome de PAPA(artritis piògena, pioderma gangrenoso y acne)(gen PSTPIP1) (cas índex) (Sang)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient No dejú

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºc
(indica com conservar la mostra)

GG75411 4772 Estudi genètic de la síndrome de Townes-Brocks (gen SALL1)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra ☐Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G19511 4308 Estudi genètic en la síndrome del cromosoma X fràgil

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 6 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra A criteri del facultatiu responsable, la prova 4408 s'elimina de la petició i es genera internament des de Infinity la prova 4308, per la qual cosa s'enviarà 30 µg de solució de DNA en una concentració aproximada de 20ng/µL.
DNA conservat a 4 ºC però es pot enviar a temperatura ambient.

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 any a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G45511 4771 Estudi genètic de la síndrome de Townes-Brocks (gen SALL1)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra ☐Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE84111 4383 Estudi genètic en la xantomatosi cerebrotendinosa (gen CYP27A1) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE84211 4382 Estudi genètic en la xantomatosi cerebrotendinosa (gen CYP27A1) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G51811 4353 Estudi genètic en l'angioedema hereditari tipus I (gen SERPING1) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 4 dies (-18 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)

G05711 4352 Estudi genètic en l'angioedema hereditari tipus I (gen SERPING1) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 4 dies (-18 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G51511 4355 Estudi genètic en l'angioedema hereditari tipus III (gen F12) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 4 dies (-18 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)

G51411 4354 Estudi genètic en l'angioedema hereditari tipus III (gen F12) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 4 dies (-18 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE53211 4548 Estudi genètic de la síndrome de Wolfram (gen WFS1)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu □≤ 1 dia a (15-25) °C□□; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE53111 4547 Estudi genètic de la síndrome de Wolfram (gen WFS1)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu □≤ 1 dia a (15-25) °C□□; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

G73211 4322 Estudi genètic en l'atàxia amb apràxia oculomotora tipus 1 (gen APTX) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

G34611 4321 Estudi genètic en l'atàxia amb apràxia oculomotora tipus 1 (gen APTX) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G73411 4324 Estudi genètic en l'atàxia amb apràxia oculomotora tipus 2 (gen SETX) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G34911 4323 Estudi genètic en l'atàxia amb apràxia oculomotora tipus 2 (gen SETX) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G03711 3878 Estudi genètic en l'atrofia espinal muscular juvenil (SMN1 / SMN2)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤1 dia (15 – 25)ºC; ≤3 dias (2 – 8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Z05472 4302 Estudi del DNA en la susceptibilitat genètica a la celiaquia, que inclou: DNA(San)—Haplotip HLA-DQ2; nom.entític arb. (0;1) DNA(San)—Haplotip HLA-DQ8; nom.arb. (0;1)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GE479SV 4329 Estudi genètic en la susceptibilitat genètica als psicofàrmacs (Citocrom P450: CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19,CYP2D6, CYP3A4)

Tipus de mostra Saliva **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub inclòs a l'equip de recollida de mostra Neurofarmagen, subministrat pel laboratori proveïdor (AB-biotics) *Codi SAP: --*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha d'acompanyar la mostra amb el formulari de sol·licitud i del consentiment informat correponent

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 mesos a (18-24) ºC dins del col·lector
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G04111 3893 Estudi genètic de l'atròfia òptica (gen OPA1)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

GG01111 4565 Estudi genètic de l'atròfia òptica (gen OPA1)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies□□ a (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

GE56185 4825 Estudi genètic d'exoma filtrat mitjançant termes HPO

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra Ha d'anar acompanyada d'un full de derivació que ha de ser revisat per Genètica.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GT03511 4451 Estudi genètic de cribratge de portadors de distròfies hereditàries de retina

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang:< 24 hores a temperatura ambient [10]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G54811 4343 Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) 2A (gen CAPN3)(cas índex) (sang)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient No dejú.

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN49311 4584 Estudi genètic de l'atròfia òptica (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a □□(15-25) °C□□; ≤ 4 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN49411 4585 Estudi genètic de l'atròfia òptica(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a □□(15-25) °C□□; ≤ 4 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GN136RS 4596 Estudi "in vitro" de variants genètiques-RNA

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2,5mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub subministrat pel laboratori proveïdor Hospital Territorial Girona (Gencardio) (RNA) *Codi SAP: --*

Condicions d'obtenció de la mostra El tub Paxgene és subministrat pel laboratori extern. L'etiqueta té la següent descripció: "T818-PAXgene 2,5 mL (ARN)"

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G54911 4344 Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) 2A (gen CAPN3)(cas familiar) (sang)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient No dejú.

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G42311 4588 Estudi genètic de la sordesa hereditària materna induïda per aminoglicòsids (gen MTRNR1)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a □□(15-25) °C□□; ≤ 4 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GG78911 4587 Estudi genètic de la sordesa neurosensorial (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a □□(15-25) °C□□; ≤ 4 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GG73111 4586 Estudi genètic de la sordesa neurosensorial (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a □□(15-25) °C□□; ≤ 4 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG93511 46270 Estudi genètic de la trimetilaminúria (gen FMO3) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) ºC; > 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG93411 46260 Estudi genètic de la trimetilaminúria (gen FMO3)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) ºC; > 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GT16911 4549 Estudi genètic de l'alfa triptassèmia hereditària (PCR digital)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN07711 4804 Estudi genètic de l'atàxia (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN07611 4803 Estudi genètic de l'atàxia (panell NGS) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GT03011 4754 Estudi genètic de l'atàxia espinocerebel·losa de tipus 27B (gen FGF14) (estudi expansió)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang:< 24 hores a temperatura ambient [10]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN39211 4566 Estudi genètic de l'atàxia SCA-37 (gen DAB1) (estudi expansió)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C□□; ≤ 3 dies□□ a (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

GT24211 7308 Estudi genètic de les calcificacions cerebrals (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

GT24111 7307 Estudi genètic de les calcificacions cerebrals (panell)(cas index)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G42211 4590 Estudi genètic de la síndrome MELAS (gen MTTL1-mutacions prevalents)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a □□(15-25) °C□□; ≤ 4 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GN03211 4582 Estudi genètic de les cardiopaties congènites (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE87511 4581 Estudi genètic de les cardiopaties congènites (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN08011 4773 Estudi genètic de les displàsies esquelètiques (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

G42058 4591 Estudi genètic de la síndrome MELAS (gen MTTL1-mutacions prevalents)(Orina)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5mL

Preparació pacient —

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores □(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GN08011 4774 Estudi genètic de les displàsies esquelètiques(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GT05911 3952 Estudi genètic de les distrofinopaties (gen DMD)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

GT05811 3951 Estudi genètic de les distrofinopaties (gen DMD)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

GT05711 3950 Estudi genètic de les distrofinopaties (gen DMD)(MLPA)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE73511 4482 Estudi genètic de les glomerulopaties/Alport (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 3 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE93511 4414 Estudi genètic en les immunodeficiències primàries (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-25) ºC; ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE73611 4481 Estudi genètic de les glomerulopaties/Alport (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 3 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE93211 4413 Estudi genètic en les immunodeficiències primàries (panell NGS) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-25) ºC; ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE96111 4614 Estudi genètic de les malalties autoinflamatòries (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha d'adjuntar el qüestionari que tenen els clínics i enviar-lo amb la mostra.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 4 dies a □(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE96011 4613 Estudi genètic de les malalties autoinflamatòries (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha d'adjuntar el qüestionari que tenen els clínics i enviar-lo amb la mostra.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 4 dies a □(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE65211 4593 Estudi genètic de les metabolopaties (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a □□(15-25) °C□□; ≤ 4 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE73011 5200 Estudi genètic fetal en sang materna

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 8 mL

Preparació pacient Full addicional d'informació per a la gestant.

Condicions d'obtenció de la mostra Recollida de la mostra de dilluns a dijous en Atenció Primaria. El tub, que el proporciona el laboratori extern (Cell-Free DNA BCT) i es distribueix als centres extractors des de l'LCTMS, ha d'anar en posició estable i vertical.
Si es rebés alguna mostra en divendres o vigília de festiu, es podria enviar al laboratori extern el següent dia laborable.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 10 dies a (18-30) ºC (mantenint el tub en vertical i protegit de la llum)
(indica com conservar la mostra)

G34011 4295 Estudi genètic per al gen JAK2

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE64711 4592 Estudi genètic de les metabolopaties (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a □□(15-25) °C□□; ≤ 4 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GN05511 4423 Estudi del gen VCP (valosin containing protein) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE89211 4422 Estudi del gen VCP (valosin containing protein) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Y37211 4620 Estudi del subtip al·lèlic del gen HLA-A

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies ☐(15-25) °C ; ≤ 7 dies (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

Z10211 4619 Estudi del subtip al·lèlic del gen HLA-DRB1

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies ☐(15-25) °C ; ≤ 7 dies (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

H00172 1955 Estudi dels enzims eritrocitaris

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra El pacient no ha hagut de ser transfós en un període mínim d'un mes en el moment de l'extracció

Tractament de la mostra NOTA: S'han de rebre dos tubs primaris, identificats amb les etiquetes "T911-HEPAR Na 10 mL VERD (SUB)" i "T14-EDTA K3 3 mL LILA (SUB)".No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC; ≤ 24 hores a (18-22) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE69911 4564 Estudi genètic de l'epilèpsia (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE70011 4563 Estudi genètic de l'epilèpsia (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

G81911 4644 Estudi genètic de la cavernomatosi cerebral familiar (gen CCM2)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Conserveu la mostra fins l'arribada al laboratori refrigerat.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G81811 4377 Estudi genètic de la cavernomatosi cerebral familiar (gen KRIT1)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Conserveu la mostra fins l'arribada al laboratori refrigerat.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G82011 4645 Estudi genètic de la cavernomatosi cerebral familiar (gen PDCD10)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Conserveu la mostra fins l'arribada al laboratori refrigerat.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN10411 4376 Estudi genètic de la cavernomatosi cerebral familiar (panell NGS) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Conserveu la mostra fins l'arribada al laboratori refrigerat.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GT13211 4769 Estudi genètic de la colestasi intrahepàtica (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GG95811 4571 Estudi d'inactivació del cromosoma X

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GT13311 4768 Estudi genètic de la colestasi intrahepàtica (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

TF06172 4216 Pac(San)—Estudi farmacocinètic d'everolimus(Certican®); arb.{Àrea sota la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

GE78711 4536 Estudi genètic de la deficiència del Factor VIII de la coagulació (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

TF04166 4196 Pac(Pla)—Estudi farmacocinètic de micofenolat(CellCept®); arb.{Àrea sota la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [10]; ≤ 11 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G17311 4537 Estudi genètic de la deficiència del Factor VIII de la coagulació (portadors)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

TF05166 4206 Pac(Pla)—Estudi farmacocinètic de micofenolat(Myfortic®); arb.{Àrea sota la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [10]; ≤ 11 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GE75211 2101 Estudi genètic de la deficiència del Factor XI de la coagulació (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Refrigereu (2 - 8) ºC. Es pot enviar a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE99811 4410 Estudi genètic de la glomerulopatia C3 (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dias refrigerada.
(Indica com conservar la mostra)

GE99711 4409 Estudi genètic de la glomerulopatia C3 (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dias refrigerada.
(Indica com conservar la mostra)

G33311 2100 Estudi genètic de la deficiència del Factor XI de la coagulació (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Refrigereu (2 - 8) ºC. Es pot enviar a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG35011 4764 Estudi genètic de la hipercalcemia hipocalciúrica familiar (gen CASR)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a □□(15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºc
(indica com conservar la mostra)

G69511 4763 Estudi genètic de la hipercalcemia hipocalciúrica familiar (gen CASR)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a □□(15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºc
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN36711 4443 Estudi genètic de la hiperoxal·lúria primària [AGXT, GRHPR, HOGA1]- seq. (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dia a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN36611 4442 Estudi genètic de la hiperoxal·lúria primària [AGXT, GRHPR, HOGA1]- seq. (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dia a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

TF07172 4226 Pac(San)—Estudi farmacocinètic de sirolimus(Rapamune®); arb.{Àrea sota la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE24111 4616 Estudi genètic de la hiperplàsia suprarenal congènita (gen CYP11B1)(cas familiar)

Tipus de mostra **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a □(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE24011 4615 Estudi genètic de la hiperplàsia suprarenal congènita (gen CYP11B1)(cas índex)

Tipus de mostra **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE89511 4453 Estudi genètic de la hipofosfatàssia (gen ALPL)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

TF01172 4166 Pac(San)—Estudi farmacocinètic de tacrolimus(Adoport®); arb.{Àrea sota la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

GE89311 4452 Estudi genètic de la hipofosfatàssia (gen ALPL)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE87011 4621 Estudi genètic de la demència d'Alzheimer (gens APOE, APP, PSEN1, PSEN2) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dia□□ a (15-25) °C; ≤ 4 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE23311 4447 Estudi genètic de la ictiosi (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºc
(indica com conservar la mostra)

GN03711 4622 Estudi genètic de la demència d'Alzheimer (gens APOE, APP, PSEN1, PSEN2) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dia□□ a (15-25) °C; ≤ 4 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GN09111 4659 Estudi genètic de la displàsia espondiloepifisaria (gen ACAN)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE23211 4446 Estudi genètic de la ictiosi (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN09011 4658 Estudi genètic de la displàsia espondiloepifisaria (gen ACAN)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

G79811 4767 Estudi genètic de la incontinència pigmenti (gen IKBKG)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G08911 4766 Estudi genètic de la incontinència pigmenti (gen IKBKG)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

TF02172 4176 Pac(San)—Estudi farmacocinètic de tacrolimus(Advagraf®); arb.{Àrea sota la corba de concentració de massa-temps(24 hores)}

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

G57511 4407 Estudi genètic de la lisencefalina (gen DCX) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G57411 4406 Estudi genètic de la lisencefalina (gen DCX) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

TF03172 4186 Pac(San)—Estudi farmacocinètic de tacrolimus(Envarsus®); arb.{Àrea sota la corba de concentració de massa-temps(24 hores)}

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

GG08711 4598 Estudi genètic de la malaltia de Charcot-Marie-Tooth axonal (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG08511 4597 Estudi genètic de la malaltia de Charcot-Marie-Tooth desmielinizant (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a □(15-25) °C; ≤ 3 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

TF00172 4156 Pac(San)—Estudi farmacocinètic de tacrolimus(Prograf®); arb.{Àrea sota la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

GN56911 4650 Estudi genètic de la malaltia de Darier (gen ATP2A2) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN56811 4649 Estudi genètic de la malaltia de Darier (gen ATP2A2) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G76211 4576 Estudi genètic de la malaltia de Fabry (gen GLA)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a □□(15-25) °C; ≤ 4 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

G40111 4575 Estudi genètic de la malaltia de Fabry (gen GLA)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a □□(15-25) °C; ≤ 4 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G76311 4580 Estudi genètic de la malaltia de Gaucher (gen GBA)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies□□ a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a □□(2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G40311 4579 Estudi genètic de la malaltia de Gaucher (gen GBA)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies□□ a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a □□(2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GT17411 4660 Estudi genètic de la malaltia de Huntington-like (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a □□(15-25) °C; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG26811 4651 Estudi genètic de la fibrosi quística (gen CFTR) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu □≤ 2 dies (18-25) ºC;≤ 4 dies (4-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G82111 4568 Estudi genètic de la malaltia de McArdle (glucogenosis tipus V) (gen PYGM)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GG31511 4567 Estudi genètic de la malaltia de McArdle (glucogenosis tipus V) (gen PYGM)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN18411 4572 Estudi genètic de la malaltia de Sturge Weber (mutació p.Arg183Gln del gen GNAQ)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GG26511 4652 Estudi genètic de la fibrosi quística (gen CFTR) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu □≤ 2 dies (18-25) ºC;≤ 4 dies (4-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG76811 4655 Estudi genètic de la malaltia de von Hippel-Lindau (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (15-25) ºC; ≤ 30 diess a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE81211 4574 Estudi genètic de la malaltia poliquística renal (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 18 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra L'entrega hauria de ser de dilluns a dijous. Entrega al día següent de l'extracció (no en fred).

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C
(indica com conservar la mostra)

GE81311 4573 Estudi genètic de la malaltia poliquística renal (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 18 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra L'entrega hauria de ser de dilluns a dijous. Entrega al día següent de l'extracció (no en fred).

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C
(indica com conservar la mostra)

GN19111 4488 Estudi genètic de la migranya hemiplègica familiar (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra ☐Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN19011 4487 Estudi genètic de la migranya hemiplègica familiar (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra ☐Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

GN31711 4486 Estudi genètic de la síndrome hemolítica urèmica atípica (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies☐☐ a (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

GN32311 4485 Estudi genètic de la síndrome hemolítica urèmica atípica (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies☐☐ a (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN44911 4570 Estudi genètic de les porfíries (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN45011 4569 Estudi genètic de les porfíries (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG24411 4792 Estudi genètic de l'esclerosi tuberosa (gen TSC1)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG24711 4793 Estudi genètic de l'esclerosi tuberosa (gen TSC2)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

G63911 4498 Estudi genètic del raquitisme hipofosfatèmic (gen PHEX) (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies□□ a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G29611 4791 Estudi genètic de l'esclerosi tuberosa (gens TSC1, TSC2)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN15511 4445 Estudi genètic de l'hipogonadisme hipogonadotròpic (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 4 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GT05411 4511 Estudi genètic del gen CYP2C19 (*2, *3, *17)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 24 hores a temperatura ambient [10]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GN15411 4444 Estudi genètic de l'hipogonadisme hipogonadotròpic (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 4 dies□□ a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN59211 4589 Estudi genètic de la mastocitosi (gen KIT, mutació D816V)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GT17511 4514 Estudi genètic de l'hipoparatiroïdisme (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GT17611 4513 Estudi genètic de l'hipoparatiroïdisme (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE58285 4530 Estudi genètic del pseudoxantoma elàstic (gen ABCC6)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE58385 4529 Estudi genètic del pseudoxantoma elàstic (gen ABCC6)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

CO7466 1103 Estudi multimèric del Factor von Willebrand

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Indicar valors de FVW antigen I FVW cofactor de la ristocetina

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el plasma en dos recipients secundaris (mínim 1 mL cadascún). Conserveu a ≤ -20ºC. Envieu les mostres congelades.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

G64011 4499 Estudi genètic del raquitisme hipofosfatèmic (gen PHEX) (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies□□ a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q20566U 9108 Pla—Etanol; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient No emprar alcohol ni altres desinfectants volàtils en el lloc de venopunció. Es recomana aplicar solucions aquosas de Zephiran (cloruro de benzalconi), de Merthiolate (timerosal) o povidona yodada.

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 h□□ a (15-25) °C tapat [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q20458 4255 Uri—Etanol / Creatinini; raó massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina recent.

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (2-8)°C; ≤ 14 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

W11958 3123 Uri—Etilglucurònid; c.arb.(negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí. S'ha de congelar immediatament.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q20785 4510 Srm—Etosuximida; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP:* *10010742*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (18-24) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W51472 3761 San—Everolimus; c.massa(UHPLC-MS/MS; no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de la mostra ha de ser predosi. S'ha de fer constar l'hora de l'extracció i l'hora de la darrera dosi.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)

KK00159 8480 Pac(Uri)—Excreció component monoclonal;cabal massa(24h)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 10 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q23759 3190 Pac(Uri)—Excreció d'adrenalini+noradrenalini(fraccionades); cabal subst.(24h)(HPLC-EQ)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

a) El pacient, una setmana abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de deixar de prendre els medicaments següents: antidepressius tricíclics, alfa-bloquejants, sedants, tranquil·litzants, tetraciclines, salicilats, hipotensors i complexos vitamínics que continguin vitamina C.
b) El pacient, dos dies abans de la recollida de la mostra d'orina, ha d'eliminar de la seva dieta el següents aliments: tot tipus de fruits secs, albergínies, tomàquets, alvocats, prunes, pinya, dàtils, plàtans, meló, raïm, kiwi, xocolata, formatge i caramels o dolços.
c) El pacient, dotze hores abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de suspendre qualsevol injecció o infusió d'epinefrina, norepinefrina o dopamina.
d) El pacient, durant la recollida de l'orina, no ha de realitzar exercici intens, fumar ni consumir cafè, te i begudes alcohòliques.
[132], [133], [134], [135]

Recipient primari Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) *Codi SAP: 10012744*

Recipient secundari Tub de poliestirè (30 mL) amb faldó i tap roscat Sardsted, amb àcid clorhídric, inclòs a l'equip amb contenidor d'orina de 24 hores (SAP 10012744) *Codi SAP: --*

Condicions d'obtenció de la mostra

Requisits particulars relacionats amb l'obtenció de la mostra:
El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i descartar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina), el pacient ha de recollir tota la orina que produeixi en el recipient gran subministrat pel laboratori. A la tarda-nit, el pacient ha d'afegir el contingut del flascó d'àcid clorhídric que ve amb el recipient gran (el flascó amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb cura, ja que aquest producte és corrosiu i pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el recipient després de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al laboratori. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mirar el volum recollit que indica el recipient gran i anotar-ho. Després, ha de mesclar bé tot el volum i omplir el flascó de polipropilè de 100 mL que també ve amb el recipient gran i lliurar-ho al laboratori.
[132], [133], [134], [135]

Requisits particulars relacionats amb la recollida i transport de la mostra previs a la seva anàlisi:
-Una vegada arriba la mostra a l'Àrea Premetrològica del Laboratori Clínic, s'ha de congelar la mostra immediatament a una temperatura ≤ -20 ºC.
-A l'Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular del Laboratori Clínic, abans de processar la mostra, s'ha de comprovar el pH de l'orina amb l'ajuda d'una tira reactiva de pH. S'accepta la mostra d'orina ÚNICAMENT quan el pH sigui ≤ 5.

Tractament de la mostra Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 20 dies a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q210O24 3119 Pac(Uri)—Excreció d'albúmina; cabal massa(24h)

Tipus de mostra	Orina	**Volum mínim**	0,2 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP:*	*10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP:*	*10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP:*	*10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP:*	*10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 mes a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q211O24 3180 Pac(Uri)—Excreció d'aldosterona; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra	Orina	**Volum mínim**	1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP:*	*10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP:*	*10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP:*	*10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP:*	*10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W50059 3189 Pac(Uri)—Excreció de 3-metoxiadrenalini+3-metoxinoradrenalini+3-metoxitiramini (fraccionades); cabal subst.(24h)(HPLC-EQ)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

a) El pacient, una setmana abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de deixar de prendre els medicaments següents: antidepressius tricíclics, alfa-bloquejants, sedants, tranquil·litzants, tetraciclines, salicilats, hipotensors i complexos vitamínics que continguin vitamina C.
b)El pacient, dos dies abans de la recollida de la mostra d'orina, ha d'eliminar de la seva dieta el següents aliments: tot tipus de fruits secs, albergínies, tomàquets, alvocats, prunes, pinya, dàtils, plàtans, meló, raïm, kiwi, xocolata, formatge i caramels o dolços.
c)El pacient, dotze hores abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de suspendre qualsevol injecció o infusió d'epinefrina, norepinefrina o dopamina.
d)El pacient, durant la recollida de l'orina, no ha de realitzar exercici intens, fumar ni consumir cafè, te i begudes alcohòliques.
[132], [133], [134], [135]

Recipient primari Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) *Codi SAP: 10012744*

Recipient secundari Tub de poliestirè (30 mL) amb faldó i tap roscat Sardsted, amb àcid clorhídric, inclòs a l'equip amb contenidor d'orina de 24 hores (SAP 10012744) *Codi SAP: --*

Condicions d'obtenció de la mostra

Requisits particulars relacionats amb l'obtenció de la mostra:
El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i descartar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina), el pacient ha de recollir tota la orina que produeixi en el recipient gran subministrat pel laboratori. A la tarda-nit, el pacient ha d'afegir el contingut del flascó d'àcid clorhídric que ve amb el recipient gran (el flascó amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb cura, ja que aquest producte és corrosiu i pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el recipient després de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al laboratori. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mirar el volum recollit que indica el recipient gran i anotar-ho. Després, ha de mesclar bé tot el volum i omplir el flascó de polipropilè de 100 mL que també ve amb el recipient gran i lliurar-ho al laboratori.
[132], [133], [134], [135]

Requisits particulars relacionats amb la recollida i transport de la mostra previs a la seva anàlisi:
-Una vegada arriba la mostra a l'Àrea Premetrològica del Laboratori Clínic, s'ha de congelar la mostra immediatament a una temperatura ≤ -18 ºC.
-A l'Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular del Laboratori Clínic, abans de processar la mostra, s'ha de comprovar el pH de l'orina amb l'ajuda d'una tira reactiva de pH. S'accepta la mostra d'orina ÚNICAMENT quan el pH sigui ≤ 5.
[132], [133], [134], [135]

Tractament de la mostra Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 20 dies a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q234O24 3198 Pac(Uri)—Excreció de 4-hidroxi-3-metoximandelat; cabal subst.(24h)(HPLC-EQ)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

a) El pacient, una setmana abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de deixar de prendre els medicaments següents: antidepressius tricíclics, alfa-bloquejants, sedants, tranquil•litzants, tetraciclines, salicilats, hipotensors i complexos vitamínics que continguin vitamina C.
b) El pacient, dos dies abans de la recollida de la mostra d'orina, ha d'eliminar de la seva dieta el següents aliments: tot tipus de fruits secs, albergínies, tomàquets, alvocats, prunes, pinya, dàtils, plàtans, meló, raïm, kiwi, xocolata, formatge i caramels o dolços.
c) El pacient, dotze hores abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de suspendre qualsevol injecció o infusió d'epinefrina, norepinefrina o dopamina.
d) El pacient, durant la recollida de l'orina, no ha de realitzar exercici intens, fumar ni consumir cafè, te i begudes alcohòliques.
[132], [133], [134], [135]

Recipient primari Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) *Codi SAP: 10012744*

Recipient secundari Tub de poliestirè (30 mL) amb faldó i tap roscat Sardsted, amb àcid clorhídric, inclòs a l'equip amb contenidor d'orina de 24 hores (SAP 10012744) *Codi SAP: --*

Condicions d'obtenció de la mostra

Requisits particulars relacionats amb l'obtenció de la mostra:
El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i descartar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina), el pacient ha de recollir tota la orina que produeixi en el recipient gran subministrat pel laboratori. A la tarda-nit, el pacient ha d'afegir el contingut del flascó d'àcid clorhídric que ve amb el recipient gran (el flascó amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb cura, ja que aquest producte és corrosiu i pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el recipient després de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al laboratori. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mirar el volum recollit que indica el recipient gran i anotar-ho. Després, ha de mesclar bé tot el volum i omplir el flascó de polipropilè de 100 mL que també ve amb el recipient gran i lliurar-ho al laboratori.
[132], [133], [134], [135]

Requisits particulars relacionats amb la recollida i transport de la mostra previs a la seva anàlisi:
- Una vegada arriba la mostra a l'Àrea Premetrològica del Laboratori Clínic, s'ha de congelar la mostra immediatament a una temperatura ≤ -18 ºC.
- A l'Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular del Laboratori Clínic, abans de processar la mostra, s'ha de comprovar el pH de l'orina amb l'ajuda d'una tira reactiva de pH. S'accepta la mostra d'orina ÚNICAMENT quan el pH sigui ≤ 5.
[132], [133], [134], [135]

Tractament de la mostra Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 20 dies a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q236O24 3201 Pac(Uri)—Excreció de 5-hidroxindolilacetat; cabal subst.(24h)(HPLC-EQ)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

a) El pacient, una setmana abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de deixar de prendre els medicaments següents: antidepressius tricíclics, alfa-bloquejants, sedants, tranquil•litzants, tetraciclines, salicilats, hipotensors i complexos vitamínics que continguin vitamina C.
B)El pacient, dos dies abans de la recollida de la mostra d'orina, ha d'eliminar de la seva dieta el següents aliments: tot tipus de fruits secs, albergínies, tomàquets, alvocats, prunes, pinya, dàtils, plàtans, meló, raïm, kiwi, xocolata, formatge i caramels o dolços.
C)El pacient, dotze hores abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de suspendre qualsevol injecció o infusió d'epinefrina, norepinefrina o dopamina.
D)El pacient, durant la recollida de l'orina, no ha de realitzar exercici intens, fumar ni consumir cafè, te i begudes alcohòliques.
[132], [133], [134], [135]

Recipient primari Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) *Codi SAP: 10012744*

Recipient secundari Tub de poliestirè (30 mL) amb faldó i tap roscat Sardsted, amb àcid clorhídric, inclòs a l'equip amb contenidor d'orina de 24 hores (SAP 10012744) *Codi SAP: --*

Condicions d'obtenció de la mostra

Requisits particulars relacionats amb l'obtenció de la mostra:
El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i descartar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina), el pacient ha de recollir tota la orina que produeixi en el recipient gran subministrat pel laboratori. A la tarda-nit, el pacient ha d'afegir el contingut del flascó d'àcid clorhídric que ve amb el recipient gran (el flascó amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb cura, ja que aquest producte és corrosiu i pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el recipient després de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al laboratori. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mirar el volum recollit que indica el recipient gran i anotar-ho. Després, ha de mesclar bé tot el volum i omplir el flascó de polipropilè de 100 mL que també ve amb el recipient gran i lliurar-ho al laboratori.
[132], [133], [134], [135]

Requisits particulars relacionats amb la recollida i transport de la mostra previs a la seva anàlisi:
-Una vegada arriba la mostra a l'Àrea Premetrològica del Laboratori Clínic, s'ha de congelar la mostra immediatament a una temperatura ≤ -18 ºC.
-A l'Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular del Laboratori Clínic, abans de processar la mostra, s'ha de comprovar el pH de l'orina amb l'ajuda d'una tira reactiva de pH. S'accepta la mostra d'orina ÚNICAMENT quan el pH està comprés entre 2 i 5.

Tractament de la mostra Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 20 dies a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q242O24 3472 Pac(Uri)—Excreció de calci(II); cabal subst.(24h)

Tipus de mostra	Orina	**Volum mínim**	—
Preparació pacient	—		
Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP:*	*10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP:*	*10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP:*	*10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP:*	*10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)

≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 4 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 3 setmanes a ≤ -20 ºC [323]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q243O24 3128 Pac(Uri)—Excreció de citrat; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) *Codi SAP: 10012744*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7:00 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció el pacient recollirà, en un flascó net i amb capacitat suficient, tota l'orina que produeixi fins a les 7:00 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina).
Un cop recollida la primera orina ha d'afegir-se l'àcid clorhídric que subministra el laboratori (el flascó amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb molta cura, ja que aquest producte pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el recipient després de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al laboratori.
Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum i anotar-lo. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 Ml, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 30 dies a (4-8)°C [7]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC (pH ≤ 1,7) [10]
(indica com conservar la mostra)

Q24459 3170 Pac(Uri)—Excreció de clorur; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]; > 1 any a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q247O24 3335 Pac(Uri)—Excreció de cortisol; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]; > 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q24859 3379 Pac(Uri)—Excreció de coure; cabal massa(24h)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina 24 hores

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal.Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu la mostra refrigerada (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 mesos a (2-8) ºC; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q249O24 3114 Pac(Uri)—Excreció de creatinini; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra	Orina	**Volum mínim**	—
Preparació pacient	—		
Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP:*	*10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP:*	*10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP:*	*10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP:*	*10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q255O24 3475 Pac(Uri)—Excreció de fosfat; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra	Orina	**Volum mínim**	—
Preparació pacient	—		
Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP:*	*10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP:*	*10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP:*	*10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP:*	*10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W188O5 3126 Pac(Uri)—Excreció de xilosa; cabal massa(5h)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'estar 8 hores en dejú i ha de llençar la primera orina recollida (buidar la bufeta). Ha de prendre 1 sobre de de 0,45 g de gaxilosa (Lactest ®) dissolt en 250 mL d'aigua. A partir d'aquest moment i durant 5 hores ha de recollir tota l'orina que produeix en un flascó net amb capacitat suficient. Cal tapar correctament el recipient després de cada micció i mantenir-lo al frigorífic.
Una vegada recollida l'orina de 5 hores, el pacient ha de mesurar-ne el volum i prendre nota.
Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL (n'hi ha prou amb mig flascó), que serà el que lliurarà i portarà anotat el volum recollit.
O bé portara l'orina recollida en un recipient al laboratori i alla`es mesurarà el volum i es prendrà nota)

Recipient primari Contenidor de 2000 mL polietilé roscat *Codi SAP: 10001051*

Recipient primari Contenidor de 2000 mL polietilé roscat *Codi SAP: 10001051*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Posar l'orina immediatament a una temperatura de (4-8)ºC fins lliurar-la al laboratori.

Tractament de la mostra Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 24 hores a 4 ºC [7]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

GN05411 4526 Estudi genètic de la miopatia congènita (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 5 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q22659 3535 Pac(Uri)—Excreció de iodur; cabal massa(24h)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP: 10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP: 10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP: 10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina de 24 hores. Indiqueu el volum.

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 mesos a (2-8)°C; ≤ 4 mesos a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

GE88711 4525 Estudi genètic de la miopatia congènita (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036)	*Codi SAP: 10007903*
Recipient primari (alternatiu)	Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045)	*Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 5 dies a □□(2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GT17311 3833 Estudi genètic de la miopatia oculofaringodistal (gen GIPC1)(estudi expansió)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 7 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GT17211 3832 Estudi genètic de la miopatia oculofaringodistal (gen LRP12)(estudi expansió)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 7 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GT17111 3831 Estudi genètic de la miopatia oculofaringodistal (gen NOTCH2NLC)(estudi expansió)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 7 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GT17011 3830 Estudi genètic de la miopatia oculofaringodistal (gen RILPL1)(estudi expansió)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 7 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE81011 4535 Estudi genètic de la nefropatia tubulointersticial (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra D' ADN, necessitem mínim 500ng per als estudis familiars i 1,5ug per als estudis del cas índex, a temperatura ambient o a 4ºC, sense problema. Si ens envieu sang, un tub de 9 ml amb EDTA és suficient per a qualsevol estudi. Si fos limitant, amb 5 ml també seria suficient per als estudis familiars. Si la sang l'envieu congelada (en neu carbònica), ha d'arribar al laboratori congelada, ja que l'extracció s'ha de fer just en descongelar-se la mostra. L'estabilitat dependrà de la quantitat de gel sec que hi poseu però en principi acostuma a ser de 24h com a màxim. Els tubs de sang han d'anar protegits en un estoig adequat, seguint les instruccions d'embalatge P650, tal i com s'indica en l'ADR (Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera)(6.2I4, ADR2003).

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE81111 4534 Estudi genètic de la nefropatia tubulointersticial (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra D' ADN, necessitem mínim 500ng per als estudis familiars i 1,5ug per als estudis del cas índex, a temperatura ambient o a 4ºC, sense problema. Si ens envieu sang, un tub de 9 ml amb EDTA és suficient per a qualsevol estudi. Si fos limitant, amb 5 ml també seria suficient per als estudis familiars. Si la sang l'envieu congelada (en neu carbònica), ha d'arribar al laboratori congelada, ja que l'extracció s'ha de fer just en descongelar-se la mostra. L'estabilitat dependrà de la quantitat de gel sec que hi poseu però en principi acostuma a ser de 24h com a màxim. Els tubs de sang han d'anar protegits en un estoig adequat, seguint les instruccions d'embalatge P650, tal i com s'indica en l'ADR (Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera)(6.2I4, ADR2003).

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q258O24 3477 Pac(Uri)—Excreció de magnesi(II); cabal subst.(24h)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q268O24 3120 Pac(Uri)—Excreció de proteïna; cabal massa(24h)

Tipus de mostra	Orina	**Volum mínim**	—
Preparació pacient	—		
Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP:*	*10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP:*	*10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP:*	*10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP:*	*10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)

≤ 1 dia a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [323]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q22459 3168 Pac(Uri)—Excreció d'ió potassi; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra	Orina	**Volum mínim**	—
Preparació pacient	—		
Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP:*	*10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP:*	*10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP:*	*10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP:*	*10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 45 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 2 mesos a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q22559 3165 Pac(Uri)—Excreció d'ió sodi; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra	Orina	**Volum mínim**	—
Preparació pacient	—		
Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP:*	*10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP:*	*10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP:*	*10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP:*	*10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 45 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 45 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q929O24 3127 Pac(Uri)—Excreció d'oxalat; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient Tres dies abans de la recollida de l'orina, el pacient no ha de prendre aliments que continguin oxalats (xocolata, espinacs, taronges).

Recipient primari Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) *Codi SAP: 10012744*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7:00 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció el pacient recollirà, en un flascó net i amb capacitat suficient, tota l'orina que produeixi fins a les 7:00 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina).
Un cop recollida la primera orina ha d'afegir-se l'àcid clorhídric que subministra el laboratori (el flascó amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb molta cura, ja que aquest producte pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el recipient després de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al laboratori.
Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum i anotar-lo. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 1 hora a (20-25) ºC (pH = 1,5 i amb timol) [10]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC (pH = 5) [10]; ≤ 4 mesos a ≤ −80 ºC (pH ≤ 2 i amb timol) [10].

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q227O24 3542 Pac(Uri)—Excreció d'urat; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra	Orina	**Volum mínim**	—
Preparació pacient	—		
Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP:*	*10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP:*	*10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP:*	*10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP:*	*10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 dies a (20-25) ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q228O24 3112 Pac(Uri)—Excreció d'urea; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra	Orina	**Volum mínim**	—
Preparació pacient	—		
Recipient primari (alternatiu)	Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril	*Codi SAP:*	*10002186*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357)	*Codi SAP:*	*10017357*
Recipient primari (alternatiu)	Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer	*Codi SAP:*	*10002525*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP:*	*10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d'orinar i llençar l'orina. A partir d'aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir d'aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb capacitat suficient tota l'orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida l'orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)

≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [323]

GT03211 3633 DNA(San)—Exoma Clínic trio

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	9 mL
Preparació pacient			
Recipient primari	Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036)	*Codi SAP:*	*10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

A més de les tres peticions, cal lliurar un full de derivació indicant Exoma Clínic Trio i incloent la informació clínica/HPO del pacient al costat de les 3 mostres (dels tres familiars). Es rebrà un informe per a cada pacient.

Tractament de la mostra

☐Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)

≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (4-8) ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K09185 7311 Srm—Factor B del complement; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necesiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (20-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC; ≤ 4 setmanes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

W93772 4507 Pla—Factor de creixement de fibroblasts 23 (FGF23); c.subst.arb.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 30 dies a ≤ -20 °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W29666 4449 Pla—Factor de creixement endotelial vascular (VEGF); c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Dejú de 8 hores.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 30 dies a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

W58466 3602 Pla—Factor de creixement endotelial vascular D (VEGF-D); c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (2-8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 30 dies a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q27785 3506 Srm—Factor de creixement insulinoide I; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra s'ha de centrifugar, aliquotar i conservar a -20 ºC abans de 3 hores

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [7], [10]

(indica com conservar la mostra)

K09385 7024 Srm—Factor H del complement; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necesiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C03866 1834 Pla—Factor IX de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.; IS 99/826)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(Indica com conservar la mostra)

C09566 1807 Pla—Factor V de la coagulació; c.subst.(coagul.)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C05066 1833 Pla—Factor VII de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.; IS 99/826)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

C05266 1840 Pla—Factor VIII de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.; IS 97/586)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C05366 1870 Pla—Factor VIII de la coagulació (cromogènic)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) Sense centrifugar: ≤ 6 hores a temperatura ambient. Centrifugat: ≤ 1 dia a (2-8) ºC; ≤ 2 setmanes a ≤ -20 ºC; ≤ 1 any a ≤ -80 ºC

C05566 1843 Pla—Factor von Willebrand; c.subst.arb.(immunoquím.; IS 97/586)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C05666 1844 Pla—Factor von Willebrand; c.subst.arb.(activitat del cofactor de la ristocetina; agreg.)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

K09485 7023 Srm—Factor I del complement; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necesiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitud ≤ 30 o 7 dies? a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C09766 1835 Pla—Factor X de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.; IS 99/826)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

C09866 1836 Pla—Factor XI de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C09966 1837 Pla—Factor XII de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

C10066 1915 Pla—Factor XIII de la coagulació; c.subst.arb.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Plasma pobre en plaquetes (PPP)

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 500 g durant 15 min a (18-22) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari i repetiu la centrifugació . Transferiu el plasma a un altre recipient secundari. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 14 dies a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A04985 3901 Srm—Factors reumatoides; c.subst.arb.(OMS 64/2)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se sèrum i plasma con EDTA tripotàssic i citrat sòdic.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

K10385 7335 Srm—FAS lligand soluble circulant (sFASL); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 30 dies a ≤ -20 °C; ≤ 6 mesos a ≤ -80 °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W71985 4505 Srm—Felbamat;c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra ☐Extracció pre-dosi.
-Per a les mostres que s'obtenen al propi Hospital, una vegada arribin al laboratori, aquestes s'han de centrifugar, aliquotar i emmagatzemar a (2-8) ºc.
-☐Per a les mostres que es reben d'altres centres de salut, les mostres s'han de centrifugar prèviament, transportar-se a temperatura ambient (si triguen menys de 72 h en arribar al laboratori) o a (2-8) ºc (si triguen més de 72 h en arribar al laboratori) i, una vegada arribin al laboratori, s'han d'emmagatzemar a (2-8) ºc.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC, i transferiu al recipient secundari.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-30) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a - 20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)

Q27966U 9097 Pla—Fenitoïna; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [7]; ≤ 1 mes a (4-8) ºC [10];≤ 5 mesos a≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q27985 3757 Srm—Fenitoïna; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de la mostra ha de ser predosi. El gel separador dels tubs per a l'obtenció de sèrum produeix disminució de la concentració de fenitoïna.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96]; ≤ 24 hores a (4) ºC [96]; ≤ 5 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

W11785 3758 Srm—Fenitoïna(lliure); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció predosi.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 14 dies a (2-8)°C; ≤ 3 mesos a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q28066U 9098 Pla—Fenobarbital; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [7]
(indica com conservar la mostra)

Q28085 3756 Srm—Fenobarbital; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra El temps de mostreig no és important. No obstant per fer mesures comparatives, l'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96]; ≤ 24 hores a (4) ºC [96]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Y05272 1036 Ers(San)—Fenotip eritrocitari Rh complet; tàxon

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q28585 3547 Srm—Ferritina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se sèrum i plasma amb heparina sòdica, EDTA tripotàssic i citrat sòdic.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q28566 9090 Pla—Ferritina; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient No cal cap preparació del pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se sèrum i plasma amb heparina sòdica, EDTA tripotàssic i citrat sòdic.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

W60585 3603 Srm—Ferritina glicosilada; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient No cal cap preparació del pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC; > 24 hores a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q28685 3548 Srm—Ferro(II+III); c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 setmanes a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

C03166 1643 Pla—Fibrina soluble; c.arb.(gelificació per etanol) (negatiu, positiu dèbil, positiu)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a temperatura ambient
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C06366 1789 Pla—Fibrinogen; c.massa(coagul.; "Clauss"; no urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

C06366U 9056 Pla—Fibrinogen; c.massa(coagul.; "Clauss"; urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C06466 1788 Pla—Fibrinogen; c.massa(coagul.; "derivat")

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 4,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a (18 - 25) ºc

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

W96361 5003 Ren—Filtrat glomerular; cabal vol.(equació Schwartz 2009)

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W18161 3118 Ren—Filtrat glomerular; cabal vol.(equació CKD-EPI; no urgent)

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8]

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]

W18166 9051 Ren—Filtrat glomerular;cabal vol. (equació CKD-EPI; urgent)

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q29585 3676 Srm—Fol·litropina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 5 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]. Congelar només un cop.

Q29785 3550 Srm—Folats; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores. En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 2 hores a (15-25) ºC [7]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 28 dies a (-25 a -15) ºC [7]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q29985 3474 Srm—Fosfat; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q29966U 9041 Pla—Fosfat; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q60858 3995 Uri—Fosfat / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q43772 3552 San—5'-Fosfat de piridoxal("Vitamina B6"); c.subst.(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú [7], [183]

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP:* *10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Protegir de la llum.

Tractament de la mostra Preserveu de la llum i conserveu a (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a temperatura ambient i protegida de la llum [7]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC i protegida de la llum [7]; ≤ 6 mesos a -20 ºC i protegida de la llum [183].
(indica com conservar la mostra)

Z05772 8980 DNA(San)—Gen HLA-B(*51); nom.entític arb. (0 1) ("Malaltia de Behçet")

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP:* *10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q30385 3461 Srm—Fosfatasa alcalina; c.cat.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10]. NOTA: A –10 ºC, s'ha descrit una disminució del 25% de l'activitat en 6 mesos i, a 4 ºC, un augment del (5-10)% en un dia.

Q30366U 9036 Pla—Fosfatasa alcalina; c.cat.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 12 hores a (15-25) ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q31185 4266 Srm—Fructosa-bisfosfat-aldolasa; c.cat.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10010742*
Recipient primari (alternatiu)	(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10006094*
Recipient primari (alternatiu)	(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210)	*Codi SAP: 10014965*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Si s'ha d'enviar més d'una alíquota, transferiu el sèrum al recipient secundari; en cas contrari, envieu el recipient primari centrifugat. Conserveu a (2-8)ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q31385 4450 Srm—Fructosamina;c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (4-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C07572 1811 Pqs(San)—"Funcionalisme" en presència d'ADP i col·lagen; temps(PFA-100)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2,7 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

C07672 1810 Pqs(San)—"Funcionalisme" en presència d'epinefrina i col·lagen; temps(PFA-100)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2,7 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

N19040 4594 Prt(Lks)—Galactocerebrosidasa; cont.cat.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 10mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha de coordinar l'enviament de la mostra amb el laboratori del H. Clínic avisant a la Dra. Sònia Pajares (spajares@clinic.cat) o a la Dra. Laura Gort (lgort@clinic.cat). Les seves dates per a l'extracció de leucòcits són els dimecres, cada quinze dies, i la mostra l'han de tenir al laboratori el dia d'abans. Per aquest motiu la mostra l'hem de rebre a la Recepció de Mostres el dilluns. Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa, no emparentat, amb el mateix tipus de tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T809-Control HEP.Na 6 mL VERD (SUB)

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (18-22) °C;≤ 48 hores (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

W05485 3808 Srm—Ganciclovir(extracció pre-dosi); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (18-24) °C; ≤ 2 dies a □(2-8) °C ; ≤ 3 mesos a □(-20) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W05385 3809 Srm—Ganciclovir(post-infusió); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (18-24) °C; ≤ 2 dies a □(2-8) °C ; ≤ 3 mesos a □(-20) °C
(indica com conservar la mostra)

Q31785 3579 Srm—Gastrina; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores. La medicació amb antihistamínics ha de ser suspesa al menys 3 dies abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra No s'han d'utilitzar tubs amb anticoagulants.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [39]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GT02111 4540 DNA(San)—Gen ABCA4(NG_009073.2, NM_000350.3); var.seq. (Distròfies hereditàries de retina, regions intròniques)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

G10711 3873 DNA(San)—Gen ACE (rs4646994); nom.entític (0, 1, 2) ("Variant I/D")

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G57111 3874 DNA(San)—Gen APOE; var.seq., expressat per: - DNA(San)—Gen APOE (NM_000041.2: c.388T>C); nom.entític (0 1 2) ("ApoE4") - DNA(San)—Gen APOE (NM_000041.2: c.526C>T); nom.entític (0 1 2) ("ApoE2")

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	3 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]		

G03911 3870 DNA(San)—Gen AR (NM_000044.6); var.seq. ("atròfia muscular espinal i bulbar de Kennedy", expansions)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	9 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G77611 8522 DNA(San)—Gen ATXN2 (NM_001372574.1); var.seq. ("Esclerosi lateral amiotròfica", expansions)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GE09911 4375 DNA(San)—Gen c9orf72(NM_018325.4); var.seq. ("Esclerosi lateral amiotròfica", expansions)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G11511 3875 DNA(San)—Gen CYP21A2; var.seq. ("Esteroide 21-monooxigenasa"), expressat per:
- DNA(San)—Gen CYP21A2 (NM_000500.5: c.92C>T); nom. entític (0 1 2),
- Id. (NM_000500.5: c.844G>T),
- Id. (NM_000500.5: c.1019G>A) i
- Id. (NM_000500.5: c.1360C>T).

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN19911 4476 DNA(San)—Gen CYP2C9; var.seq., expressat per:
- DNA(San)—Gen CYP2C9 (NM_000771.4: c.430C>T); nom.entític (0 1 2)
- DNA(San)—Gen CYP2C9 (NM_000771.4: c.1075A>C); nom.entític (0 1 2)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
(indica com conservar la mostra) DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G48811 4306 DNA(San)—Gen F12 (LRG_145t1:c.-4C>T); nom.entític (0, 1, 2)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G20711 3894 DNA(San)—Gen F2 (LRG_551t1:c.*97G>A); nom.entític (0, 1, 2) ("20210 G>A", "rs1799963")

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G20811 3895 DNA(San)—Gen F5 (LRG_553t1: c.1601G>A); nom.entític (0, 1, 2) ("R506Q", "Factor V Leiden")

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G45911 4544 DNA(San)—Gen FLCN (NM_144997.7); var.seq. ("Birt-Hoog-Dubé", cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies□□ Sang a (2-8) ºC [10]□; ≤ 1 any□□ DNA en solució (-20) ºC □□[10]
(Indica com conservar la mostra)

GE99611 4408 DNA(San)—Gen FMR1 (LRG_762t1); var.seq. ("Síndrome X-fràgil", cribratge expansions)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Per a preanalítica: 1 sol tub per a totes les proves de genètica de la mateixa petició.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG02511 4545 DNA(San)—Gen FLCN (LRG_325t1); var.seq. ("Birt-Hoog-Dubé", cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies□□ Sang a (2-8) ºC [10]□; ≤ 1 any□□ DNA en solució (-20) ºC □□[10]
(indica com conservar la mostra)

GN54911 3867 DNA(San)—Gen FUS (NM_004960.4); var.seq. ("Esclerosi lateral amiotròfica";cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies□□ a (2-8) ºC□□ [10]□; ≤ 1 any□□ a (-20) ºC (DNA en solució) □□[10]
(indica com conservar la mostra)

GT26111 8051 DNA(San)—Gen FUS(NM_004960.4); var.seq. ("Esclerosi lateral amiotròfica"; cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G01311 3871 DNA(San)—Gen FXN (LRG_339t1); var.seq. ("atàxia de Friedreich", expansions)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

G10911 3866 DNA(San)—Gen HFE; var.seq. ("Hemocromatosi"), expressat per: -DNA(San)—Gen HFE(LRG_874t1:c.187C>G); nom. Entític (0 1 2) -DNA(San)—Gen HFE(LRG_874t1:c.845G>A); nom. Entític (0 1 2)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Z00572 4304 DNA(San)—Gen HLA-B (*27); nom.entític arb. (0, 1)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitu (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Z06272 8977 DNA(San)—Gen HLA-B (*57:01); nom.entític arb. (0, 1)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G04611 3868 DNA(San)—Gen HTT (NM_001388492.1); var. seq. ("Huntington", expansions)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G11311 3889 DNA(San)—Gen MTHFR (LRG_726t1: c.665C>T); nom.entític(0, 1, 2)("677C>T")

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN53911 4583 DNA(San)—Gen MUC5B (NG_031880.1:g.1927G>T); nom.entític (0, 1, 2) ("rs35705950")

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

G94411 4578 DNA(San)—Gen NOTCH3 (NM_000435.3); var.seq. (CADASIL, cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G27911 4296 DNA(San)—Gen NOTCH3 (NM_000435.3); var.seq. (CADASIL, cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GT00111 8214 DNA(San)—Gen NUDT15; seq.var. expressat per: DNA(San)—Gen NUDT15 (NM_018283.4:c.415C>T); nom.entític (0 1 2) DNA(San)—Gen NUDT15 (NM_018283.4:c.36_37insGAGTCG); nom.entític (0 1 2)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Només cal un tub primari. Quan es demani una de les dos proves (G29211 Metabolitzadors lents de tiopurines (gen TPMT)-DNA (Sang) o GT00111 Metabolitzadors lents de tiopurines (gen NUDT15) (DNA-Sang)) a SAP, a Modulab s'ha d'afegir l'altre.

Tractament de la mostra Cap

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10]

G46211 4309 DNA(San)—Gen PABPN1 (NM_004643.4); var.seq. ("Distròfia muscular oculofaríngea", expansions)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G31411 4612 DNA(San)—Gen PMP22 (NM_000304.4); var.seq ("delecions")

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies□□ a (2-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra) □□DNA: ≤ 1 any□□ en solució a (-20) ºC [10]

GN21511 4599 DNA(San)—Gen PMP22 (NM_000304.4); var.seq ("duplicació","CMT1A")

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G44711 4098 DNA(San)—Gen PMP22(NM_000304.4); var.seq

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE60911 4357 DNA(San)—Gen SLCO1B1 (LRG_1022t1:c.521T>C); nom.entític (0, 1, 2)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºc [10]
(indica com conservar la mostra)

G70911 3861 DNA(San)—Gen SOD1 (LRG_652t1); var.seq. ("Esclerosi lateral amiotròfica"; cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G09811 3865 DNA(San)—Gen SOD1 (LRG_652t1); var.seq. ("Esclerosi lateral amiotròfica"; cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G29211 4356 DNA(San)—Gen TPMT; seq.var. expressat per: -DNA(San)—Gen TPMT (LRG_874t1:c.238G>C); nom.entític (0 1 2) -DNA(San)—Gen TPMT (LRG_874t1:c.460G>A); nom.entític (0 1 2) -DNA(San)—Gen TPMT (LRG_874t1:c.719A>G); nom.entític (0 1 2)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G41811 4288 DNA(San)—Gen TTR (NM_000371.4); var.seq. ("amiloidosi hereditària",cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G81711 4532 DNA(San)—Gen TTR (NM_000371.4); var.seq. ("amiloidosi hereditària",cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

GT02011 4541 DNA(San)—Gen USH2A (NG_009497.2, NM_206933.4); var.seq. (Distròfies hereditàries de retina", " regions intròniques)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GN20111 4472 DNA(San)—Gens relacionats amb la fibrosi pulmonar; var.seq. (cas índex, panell)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN20211 4473 DNA(San)—Gens relacionats amb la fibrosi pulmonar; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	0,5 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra			
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].		

GE87611 4474 DNA(San)—Gens relacionats amb el dèficit del surfactant pulmonar; var.seq. (cas índex)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	0,5 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra			
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN06111 4475 DNA(San)—Gens relacionats amb el dèficit del surfactant pulmonar; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	0,5 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra			
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].		

GN06511 4397 DNA(San)—Gens relacionats amb la dislipèmia; var.seq. (cas índex, panell)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]		

GN06611 4398 DNA(San)—Gens relacionats amb la dislipèmia; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G27511 4303 DNA(San)—Gens relacionats amb la hipercolesterolèmia familiar; var. seq. (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5,4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GG35211 4325 DNA(San)—Gens relacionats amb la hipercolesterolèmia familiar; var. seq. (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5,4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN22111 4440 DNA(San)—Gens relacionats amb la hipertensió pulmonar primària; var.seq. (cas índex, panell)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].

GN22211 4441 DNA(San)—Gens relacionats amb la hipertensió pulmonar primària; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GE34011 4326 DNA(San)—Gens relacionats amb la hipertrigliceridèmia; var.seq., expressat per:
- DNA(San)—Gen ZPR1(NM_003904.4:c.*724C>G); nom. entític (0 1 2)
- Id. Gen APOA5,
- Id. Gen GCKR,
- Id. Gen LPL,
- Id. Gen BAZ1B i
- Id. Gen TRIB

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GN19411 4656 DNA(San)—Gens relacionats amb la hipobetalipoproteïnèmia; var.seq. (cas índex, panell)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies□□ a (2-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra) □□DNA: ≤ 1 any□□ en solució a (-20) ºC [10]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN19511 4657 DNA(San)—Gens relacionats amb la hipobetalipoproteïnèmia; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	0,5 mL
Preparació pacient	Cap.		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies□□ a (2-8) ºC [10] □□DNA: ≤ 1 any□□ en solució a (-20) ºC [10]		

GG07011 4285 DNA(San)—Gens relacionats amb la malaltia de Charcot-Marie-Tooth; var.seq. (cas índex)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	0,5 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG06711 4539 DNA(San)—Gens relacionats amb la malaltia de Charcot-Marie-Tooth; var.seq. ("cas familiar")

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 7 dies□□ Sang a (2-8) ºC □□[10]□
□≤ 1 any □□DNA en solució (-20) ºC □□[10]

GT06911 4096 DNA(San)—Gens relacionats amb la neuropatia hereditària; var.seq. (cas índex, panell)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].

GT06811 4097 DNA(San)—Gens relacionats amb la neuropatia hereditària; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG53311 4429 DNA(San)—Gens relacionats amb la neuropatia motora distal; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GG53411 4428 DNA(San)—Gens relacionats amb la neuropatia motora distal; var.seq. (cas índex, panell)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

G42411 3876 DNA(San)—Gens relacionats amb la neuropatia òptica hereditària de Leber; var.seq., expressat per: DNA(San)—Gen MT-ND4(NC_012920.1: m.11778G>A); nom. entític arb.(0 1) Id. Gen MT-ND1 Id. Gen MT-ND6

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GG58311 4490 DNA(San)—Gens relacionats amb la paraparèsia espàstica; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies□□ a (2-8) ºC [10]
□□DNA: ≤ 1 any□□ en solució a (-20) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG58411 4489 DNA(San)—Gens relacionats amb la paraparèsia espàstica; var.seq. (cas índex)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	0,5 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies□□ a (2-8) ºC [10] □□DNA: ≤ 1 any□□ en solució a (-20) ºC [10]		

GT02811 4029 DNA(San)—Gens relacionats amb la quilomicronèmia familiar; var. seq. (cas familiar)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	1mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10]		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN16411 4433 DNA(San)—Gens relacionats amb la quilomicronèmia familiar; var. seq. (cas índex; panell)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10]		

GT03111 4028 DNA(San)—Gens relacionats amb la sitosterolèmia; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10]		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN16611 4434 DNA(San)—Gens relacionats amb la sitosterolèmia; var. seq. (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
(indica com conservar la mostra) DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10]

G45011 4332 DNA(San)—Gens relacionats amb la telangièctasi hemorràgica hereditària; var.seq. (cas índex, panell)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
(indica com conservar la mostra) DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].

GG65711 4399 DNA(San)—Gens relacionats amb la telangièctasi hemorràgica hereditària; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
(indica com conservar la mostra) DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN45211 4420 DNA(San)—Gens relacionats amb les distròfies hereditàries de la retina; var.seq. (cas índex)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	0,5 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]		

GN45111 4421 DNA(San)—Gens relacionats amb les distròfies hereditàries de la retina; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra	Sang	**Volum mínim**	0,5 mL
Preparació pacient	Cap.		
Recipient primari	Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10007897*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014981*
Condicions d'obtenció de la mostra	Cap.		
Tractament de la mostra	Cap.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	□□Sang: ≤ 7 dies□□ a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10]		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GT26211 8515 DNA(San)—Gens relacionats amb l'esclerosi lateral amiotròfica; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GT26011 8516 DNA(San)—Gens relacionats amb l'esclerosi lateral amiotròfica; var.seq. (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q31885 3794 Srm—Gentamicina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96], ≤ 24 hores a (2-8) ºC [96], ≤ 1 mes -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q31844 3793 LCR—Gentamicina; c.massa

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies tapat a (2-8) ºC [7]; ≤ 28 dies tapat a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

N71585 3617 Srm—Globotriaosilceramida (Liso-Gb3); c.massa(HPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 hores a (18-25)°C; ≤ 1 dia□ a (2-8)°C; ≤ 60 dies□ a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q32285 3857 Srm—Globulina enllaçant d'hormones sexuals; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q32466 3272 Pla—Glucagó; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub Vacuette tap rosa de 4 mL amb EDTA K3+aprotinina 13x75 mm *Codi SAP: 10000239*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de conservar-se a 4ºC fins a la seva centrifugació i enviar-la a −20 ºC al laboratori subcontractat.

Tractament de la mostra Poseu la mostra amb gel a (2-8) ºC des de la seva obtenció. Abans de 2 hores, centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 4 ºC. Separeu el plasma, transferiu al recipient secundari i congeleu immediatament [149].

Estabilitat de la magnitu ≤ 2h a (2-8) °C; ≤ 30 dias a (-20) °C
(indica com conservar la mostra)

N19140 4647 Prt(Lks)—Glucocerebrosidasa; cont.cat.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra No se puede solicitar las vísperas de festivos

Tractament de la mostra Cap. No centrifugar ni congelar

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Q32685 3216 Srm—Glucosa; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q32600 3408 Líquid—Glucosa (no urgent); c.subst.

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q32648 4049 LPt(Diàlisi)—Glucosa; c.subst.

Tipus de mostra Líquid peritoneal **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q32666U 9038 Pla—Glucosa; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q32644U 9117 LCR—Glucosa; c.subst.

Tipus de mostra Líquid cèfaLo-raquidi **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]
(indica com conservar la mostra)

Q32649U 9114 LPl—Glucosa (urgent); c.subst.

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q32649 3215 LPl—Glucosa (no urgent); c.subst.

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q32643 3214 LAs—Glucosa (no urgent); c.subst.

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q32643U 9109 LAs—Glucosa (urgent); c.subst.

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q32600U 9233 Líquid—Glucosa (urgent); c.subst.

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q32647U 9697 LPe—Glucosa; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Líquid pericàrdic **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q32651U 9698 LSi—Glucosa; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Líquid sinovial **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

H04772 1956 San—Glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa; act.cat.entítica

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Cal introduïr el resultat de la concentració d'hemoglobina (amb unitats) en la informació adicional Hb LCTMS abans de fer la remesa. Ex.: 124 g/L

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

N71685 3616 Srm—Glucosilesfingosina (Liso-Gb1); c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitu > 24 hores a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q31585 3459 Srm—gamma-Glutamiltransferasa; c.cat.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10].
(Indica com conservar la mostra)

Q31566U 9037 Pla—gamma-Glutamiltransferasa; c.cat.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q33285 3540 Srm—Haptoglobina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a (15-25) ºC [7]; ≤ 8 mesos a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q33266U 9050 Pla—Haptoglobina; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H10613U 9062 Ers(San)—Hemoglobina; c.massa ("CHCM"; urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10613 1161 Ers(San)—Hemoglobina; c.massa (“CHCM”; no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10713U 9065 Ers(San)—Hemoglobina; massa entítica ("HCM"; urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H10713 1160 Ers(San)—Hemoglobina; massa entítica ("HCM"; no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

W20724 4339 Fae—Hemoglobina; fr.massa

Tipus de mostra Femta **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Colector mostra s/codbar Sang oculta en femta *Codi SAP: 10022639*

Condicions d'obtenció de la mostra
-Comproveu que disposeu del material necessari per a la recollida de la mostra: tub i bossa verda. Escriviu el nom, l'edat i la data de recollida de la mostra a l'etiqueta del tub.
-Recolliu la mostra sobre una superfície seca (com per exemple, un orinal), que no tingui cap tipus de detergent.
-Desenrosqueu el tap verd i extreieu-ne el bastonet.
-Poseu en contacte la punta del bastonet amb la femta i feu lliscar la punta dibuixant línies horitzontals i verticals. N'hi ha prou amb poca quantitat de mostra.
-Fiqueu el bastonet dins del tub, tapeu-lo bé i moveu-lo unes quatre o cinc vegades per barrejar bé la mostra.
-Guardeu el tub a la bossa verda i conserveu-lo a la nevera fins a lliurar-lo al laboratori (màxim 3 dies). No ho congeleu

Tractament de la mostra Col·lectors de mostres

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a 25 ºC [7]; ≤ 1 setmana a (2-10) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H10172U 9030 San—Hemoglobina (urgent); c.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10172 1052 San—Hemoglobina (no urgent); c.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

W05036 3274 Hb(San)—Hemoglobina A1c; fr.subst. (expressat en mmol/mol)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (20-25) ºC [10]; ≤1 setmana a (2-4) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q32036 4297 Hb(San)—Hemoglobina A1c; fr.subst. (expressat en %)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (20-25) ºC [10]; ≤1 setmana a (2-4) ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

H05472 1941 Hb(San)—Hemoglobina A2; fr.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a (-80) ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

H08972 1952 Hb(San)—Hemoglobina C; fr.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a (-80) ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H05572 1942 Hb(San)—Hemoglobina F; fr.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a (-80) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

H21372 1953 Hb(San)—Hemoglobina S; fr.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a (-80) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

H03272 1000 "Hemograma" (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H03272U 9029 "Hemograma" (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

C03266 1653 Pla—Heparina; c.subst.arb.(enz.; IS 82/502)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient Realizar l'extracció a les 4 hores d'haver-se administrat l'HBPM

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra Tub de citrat 3.2%. Pot obtenir-se 3-4h post-administració (pic màxim) o pre-administració (mínim)

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 1 setmana a -20 ºC; ≤ 1 mes a -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q00385 3732 Srm—17-alfa-Hidroxiprogesterona; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Com aquesta magnitud té un ritme circadiari similar al del cortisol, és precís tenir-lo en compte a l'hora de l'obtenció de l'espècimen. A més a més, en les dones l'extracció es realitza durant la 1ª fase del cicle menstrual.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari i congeleu

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dia a (2-8) ºC [7];≤ 1 any a -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Z04272 8981 DNA(San)—Gen HLA-A(*29); nom.entític arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient En dejú.

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W33685 4249 LCR—Hipocretina-1; c.massa

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Z02472 4559 DNA(San)—HLA-A,-B,-Cw,-DRB1 (alta resolució) (genotipat)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 8,5 mL (Sèrum)

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC (Sèrum)
Cap. (EDTA)

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies □□(4-8)°C (Sèrum) i ≤ 24 hores (18-24) °C; ≤ 30 dies □□(4-8)°C (EDTA)
(indica com conservar la mostra)

Z05872 8982 DNA(San)—HLA-DQB1*0602; nom.entític arb. (0.1)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q34266 3923 Srm—Homocisteïna; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari S-Monovette HCY-Z-Gel *Codi SAP: 10012754*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Conserveu el tub primari a (15-25) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 hores (sense centrifugar) a (15-25)°C; ≤ 96 hores (centrifugada) a (15-25)°C
(Indica com conservar la mostra)

G10611 2102 DNA(San)—Genotip eritrocitari fetal RhD a partir de DNA fetal (sang materna); tàxon

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a (2-8) °C
(Indica com conservar la mostra)

Q79285 4346 Srm—Hormona anti-mülleriana; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Es pot fer servir sèrum o plasma obtingut amb heparina de liti. En cap cas es pot fer servir plasma amb EDTA.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q34485 4556 Srm—Imipramina+desipramina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (18-22) ºC; ≤ 28 dies a (2-8) ºC; ≤ 28 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

K07085 7291 Srm—Immunoglobulina A; c.massa (immunoturbidimetria)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 mesos a (15-25) ºC; ≤ 8 mesos a (2-8) ºC; ≤ 8 mesos a (-15 a -25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K06285 8744 Srm—Immunoglobulina A crioprecipitant (turbidimetria); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive 16x100 mm (ref. 455001) *Codi SAP: 10014637*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra S'extreuen dos tubs de 9 mL cadascun (Tub Vacuette de 9 mL, de plàstic, sense additius) i es deixa coagular durant 1 hora dintra una estufa a 37°C. Aquest procés es realitza a l'Àrea d'Immunologia, on també es centrifuga amb la centrífuga MA04, a 4.000 r.p.m. i 37ºC durant 10 minuts.
El sèrum obtingut del sobrenadant es traspassa a un tub de vidre de 25 mL de capacitat i fons cònic i es tapa amb parafilm. S'identifica aquest tub amb una etiqueta numèrica (amb el número de laboratori) i es retola sobre el tub la data i el volum total de sèrum obtingut (mínim 5 mL). A continuació es col·loca aquest tub a 4°C en la nevera MA30, en una gradeta marcada amb el nom "Crioglobulines".
NOTA: Per a anàlisis diferides, el tub secundari pot ser un tub de plàstic convencional, emmagatzemat en nevera (2-8) ºC.

Tractament de la mostra Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

II32185 4775 Srm—Immunoglobulina A Kappa; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 21 dies a (2-8) ºC [7]; > 21 días a ≤ -20 ºC o a temperatura inferior (no congelar i descongelar els sèrums més d'una vegada)
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

IGAK/IGA 4781 Srm—Immunoglobulina A Kappa/Immunoglobulina A Lambda; raó massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

II32285 4776 Srm—Immunoglobulina A Lambda; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 21 dies a (2-8) ºC [7]; > 21 días a ≤ -20 ºC o a temperatura inferior (no congelar i descongelar els sèrums més d'una vegada)
(indica com conservar la mostra)

K03485 7007 Srm—Immunoglobulina D; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (2-8)°C; ≥ 48 hores a (- 20)°C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L69185 8080 Srm—Immunoglobulina E; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

NO en té 7058 Srm—Immunoglobulina E específica; c.subst.arb

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L87685 7240 Srm—Immunoglobulina E anti component alergènic MUXF3 CCD, Bromelina (o214); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L16485 7511 Srm—Immunoglobulina E anti-Acacia longifolia; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L30285 8114 Srm—Immunoglobulina E anti-Acarus siro; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L61485 7563 Srm—Immunoglobulina E anti-Aedes communis; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L40485 8850 Srm—Immunoglobulina E anti-Allium cepa (ceba); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L21185 8149 Srm—Immunoglobulina E anti-Alternaria tenuis; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L62385 8086 Srm—Immunoglobulina E antiamoxicil·lina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L62485 8087 Srm—Immunoglobulina E antiampicil·lina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºc fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L61885 8157 Srm—Immunoglobulina E anti-Anisakis simplex; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L87385 7180 Srm—Immunoglobulina E anti-Apis mellífera rApis m 1 (i208); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L90685 7179 Srm—Immunoglobulina E anti-Apis mellífera rApis m2 (i214); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (18-24) °C; ≤ 7 dies□ a (2-8) °C; ≤ 30 dies a ≤ (-20) °C
(Indica com conservar la mostra)

L90385 7176 Srm—Immunoglobulina E anti-Apis mellífera rApis m10 (i217); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (18-24) °C; ≤ 7 dies□ a (2-8) °C; ≤ 30 dies a ≤ (-20) °C
(Indica com conservar la mostra)

L90785 7177 Srm—Immunoglobulina E anti-Apis mellífera rApis m5 (i216); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (18-24) °C; ≤ 7 dies□ a (2-8) °C; ≤ 30 dies a ≤ (-20) °C
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L91385 7178 Srm—Immunoglobulina E anti-Apis mellífera rApis m3 (i215); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (18-24) °C; ≤ 7 dies□ a (2-8) °C; ≤ 30 dies a ≤ (-20) °C
(indica com conservar la mostra)

L38085 8605 Srm—Immunoglobulina E anti-Apium graveolens (api); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L21285 8148 Srm—Immunoglobulina E anti-Aspergillus fumigatus; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L76285 7165 Srm—Immunoglobulina E anti-Aspergillus fumigatus rAsp f 2 (m219); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L76485 7166 Srm—Immunoglobulina E anti-Aspergillus fumigatus rAsp f 4 (m221); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L13485 8304 Srm—Immunoglobulina E anti-Atriplex lentiformis; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L36785 8852 Srm—Immunoglobulina E anti-all (Allium sativum); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L16185 8307 Srm—Immunoglobulina E anti-Betula verrucosa; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºc
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L53685 8600 Srm—Immunoglobulina E anti-b-lactoglobulina de Bos taurus (vaca); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

L60585 7562 Srm—Immunoglobulina E anti-Blatella germanica (escarabat); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºc
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L21685 7555 Srm—Immunoglobulina E anti-Candida albicans; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L59485 8590 Srm—Immunoglobulina E anticarn de Bos taurus (bou/vaca); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L57885 8933 Srm—Immunoglobulina E anti-salmó (salmo saler); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L59385 8603 Srm—Immunoglobulina E anticarn de Gallus gallus (pollastre); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L58985 8589 Srm—Immunoglobulina E anticarn de Sus scrofa (porc); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L53785 8601 Srm—Immunoglobulina E anticaseïna de Bos taurus (vaca); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L35685 8121 Srm—Immunoglobulina E anticaspa de Bos taururs (vaca); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L34185 8122 Srm—Immunoglobulina E anticaspa de Canis familiaris (gos); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L32585 8093 Srm—Immunoglobulina E anticaspa de Felis catus (gat); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L31285 8120 Srm—Immunoglobulina E anticaspa d'Equus caballus (cavall); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L17385 8833 Srm—Immunoglobulina E anti-Castanea sativa (castanya); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L56085 8835 Srm—Immunoglobulina E anti-Cephalopoda (calamar); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L42685 8029 Srm—Immunoglobulina E anti-Cicer arietinus (cigró); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L52785 8569 Srm—Immunoglobulina E anticlara d'ou de Gallus gallus (gallina); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L41085 8839 Srm—Immunoglobulina E anti-Cocos nucifera (coco); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L85785 8930 Srm—Immunoglobulina E anti-Components al·lergènics (microarray); prop.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) °C; ≤ 1 mes a ≤ -20 °C.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L38485 8308 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Corylus avellana; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºc
(indica com conservar la mostra)

L88385 7150 Srm—Immunoglobulina E anti-Corylus avellana rCor a 8 LTP (f425); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L56285 8836 Srm—Immunoglobulina E anti-Cancer pagurus (cranc de mar); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L86285 7210 Srm—Immunoglobulina E anti-Crupessus arizonica nCup a1 (t226); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L14685 8299 Srm—Immunoglobulina E anti-Crysanthemum leucanthemum; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L11185 8128 Srm—Immunoglobulina E anti-Dactylis glomerata; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L30485 8089 Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides farinae; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L30585 8113 Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides microceras; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L30685 8088 Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides pteronyssinus; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L87785 7120 Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides pteronyssinus rDer p1 (d202); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L87885 7122 Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides pteronyssinus rDer p10 (d205); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L88285 7121 Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides pteronyssinus rDer p2 (d203); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L91485 7123 Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides pteronyssinus rDer p23 (d209); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L32085 8123 Srm—Immunoglobulina E antiepiteli de Cavia spp. (conill porquí); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L32785 8126 Srm—Immunoglobulina E antiepiteli de Cricetus spp. (hamster); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L32185 8125 Srm—Immunoglobulina E antiepiteli d'Oryctolagus cuniculus (conill); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L42085 8851 Srm—Immunoglobulina E anti-Asparagus officinalis (espàrrec); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L17985 7510 Srm—Immunoglobulina E anti-Eucalyptus spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L30785 8118 Srm—Immunoglobulina E anti-Euroglyphus maynei; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L67085 4508 Srm—Immunoglobulina E antifluid seminal; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient __

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 7 dies refirgerada (2-8) °C; ≤ 30 dies congelada ≤ -20 °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L10385 8129 Srm—Immunoglobulina E anti-Festuca elatior; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L18085 7508 Srm—Immunoglobulina E anti-Fraxinus americana; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L44085 8103 Srm—Immunoglobulina E antifruit d'Actinidia deliciosa (kiwi); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L48085 8976 Srm—Immunoglobulina E antifruit de Capsicum frutescens (pebre vermell); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L46685 8592 Srm—Immunoglobulina E antifruit de Citrus sinensis (taronja); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L45985 8606 Srm—Immunoglobulina E antifruit de Cucumis melo (meló); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L42585 8596 Srm—Immunoglobulina E antifruit de Fragaria vesca (maduixa); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L49785 8101 Srm—Immunoglobulina E antifruit de Lycopersicon esculentum (tomaquet); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L45585 8102 Srm—Immunoglobulina E antifruit de Malus domestica (poma); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L48785 8105 Srm—Immunoglobulina E antifruit de Musa paradisiaca (banana); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L36685 8107 Srm—Immunoglobulina E antifruit de Persea americana (alvocat); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L45885 8106 Srm—Immunoglobulina E antifruit de Prunus persica (prèssec); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L47785 7589 Srm—Immunoglobulina E antifruit de Pyrus communis (pera); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L22485 7557 Srm—Immunoglobulina E anti-Fusarium spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L56885 8100 Srm—Immunoglobulina E antigamba; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L42885 8602 Srm—Immunoglobulina E antigluten; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L30885 8117 Srm—Immunoglobulina E anti-Glycyphagus domesticus; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L56485 8001 Srm—Immunoglobulina E anti-Helix spp. (cargol); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L94485 7802 Srm—Immunoglobulina E anti-Inhibició d'himenòpters; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient __

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºc. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies□ (2 - 8)°C; ≤ 30 dies□ (-20)°C
(indica com conservar la mostra)

L62785 7568 Srm—Immunoglobulina E antiinsulina bovina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L62885 7569 Srm—Immunoglobulina E antiinsulina humana; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L62985 7567 Srm—Immunoglobulina E antiinsulina porcina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L65285 7574 Srm—Immunoglobulina E antiisocianat HDI; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L65385 7573 Srm—Immunoglobulina E antiisocianat MDI; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L65485 7572 Srm—Immunoglobulina E antiisocianat TDI; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L65685 8146 Srm—Immunoglobulina E anti-Làtex; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L79085 7195 Srm—Immunoglobulina E anti-Làtex rHev b 5 (k218); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L44185 8834 Srm—Immunoglobulina E anti-Latuca sativa (enciam); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L44285 8026 Srm—Immunoglobulina E anti-Lens esculenta (llentia); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L30985 8092 Srm—Immunoglobulina E anti-Lepidoglyphus destructor; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L39285 8096 Srm—Immunoglobulina E antillavor d'Arachis hypogea (cacauet); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L10185 8136 Srm—Immunoglobulina E antillavor d'Avena sativa; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L38585 8576 Srm—Immunoglobulina E antillavor d'Avena sativa (civada); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L46785 8586 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Bertholletia excelsa (nou del Brasil); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L46585 8104 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Brassica nigra (mostassa); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L17085 8098 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Corylus avellana (avellana); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L49585 8097 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Glycine max (soja); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L14285 7577 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Helianthus annuus; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L40385 8577 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Hordeum spp. (ordi); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L47085 8108 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Juglans regia (nou); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L37285 8099 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Prunus amygdalus (ametlla); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L10685 8135 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Secale cereale; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L49485 8580 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Sesamum indicum (sèsam); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

L12185 8137 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Triticum aestivum; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L50085 8574 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Triticum aestivum (blat); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L45185 8095 Srm—Immunoglobulina E antillavor de Zea mays (blat de moro); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L38385 8156 Srm—Immunoglobulina E antillavor d'Oryza sativa (arrós); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L54385 8573 Srm—Immunoglobulina E antillet de Bos taurus (vaca); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L53985 8840 Srm—Immunoglobulina E antillet de cabra; c.subst.arb

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 7 dies refrigerada (2-8) °C; ≤ 30 dies congelada ≤ -20 °C

L54185 8841 Srm—Immunoglobulina E antillet d'ovella; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 7 dies refrigerada (2-8) °C; ≤ 30 dies congelada ≤ -20 °C

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L57485 8830 Srm—Immunoglobulina E anti-Merluccius merluccius (lluç); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 º
(indica com conservar la mostra)

L43985 8828 Srm—Immunoglobulina E anti-Phaseolus vulgaris (mongeta tendra); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L57385 8594 Srm—Immunoglobulina E anti-Mytilus spp. (musclo); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L75485 7211 Srm—Immunoglobulina E anti-Olea europaea nOle e 1 (t224); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L77585 8612 Srm—Immunoglobulina E anti-omega-5 gliadina (Blat) (f416); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L34985 8824 Srm—Immunoglobulina E anti-orina de rata; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L35185 8825 Srm—Immunoglobulina E anti-ratolí; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L53185 8832 Srm—Immunoglobulina E anti-ovomucoide; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L65985 7575 Srm—Immunoglobulina E antióxid d'etilè; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L22885 7550 Srm—Immunoglobulina E anti-Penicillium notatum; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L94185 8826 Srm—Immunoglobulina E anti-Phaseolus lunatus (mongeta de Lima); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L63085 8084 Srm—Immunoglobulina E antipeniciloil G; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L63185 8085 Srm—Immunoglobulina E antipeniciloil V; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L43885 8010 Srm—Immunoglobulina E anti-Phaseolus vulgaris (mongeta blanca); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L37685 8030 Srm—Immunoglobulina E anti-Phaseolus vulgaris (mongeta vermella); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L73285 7225 Srm—Immunoglobulina E anti-Phleum pratense rPhl p 1 (g205); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L73585 7228 Srm—Immunoglobulina E anti-Phleum pratense rPhl p 12 (g212); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L73785 7226 Srm—Immunoglobulina E anti-Phleum pratense rPhl p 5b (g215); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L73985 7227 Srm—Immunoglobulina E anti-Phleum pratense rPhl p 7 (g210); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L42285 8153 Srm—Immunoglobulina E antipol·len d'Artemisia spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L13785 8142 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Chenopodium album; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L21985 8147 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Cladosporium herbarum; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L17785 8152 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Cupressus sempervirens; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L11385 8109 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Cynodon dactylon; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L10285 8110 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Lolium perenne; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L18485 7513 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Morus alba; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L18785 8150 Srm—Immunoglobulina E antipol·len d'Olea europaea; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L15085 8155 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Parietaria judaica; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L11585 8141 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Phleum pratense; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L10485 8140 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Phragmites spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L19285 7509 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Pinus strobus; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L14485 8154 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Plantago lanceolata; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L19585 8151 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Platanus acerifolia; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L10985 8134 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Poa pratensis; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºc

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L16585 7507 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Populus deltoides; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L19785 7501 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Quercus alba; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L19985 7506 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Salix caprea; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L15385 8303 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Salsola kali; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L13985 8300 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Taraxacum vulgare; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L18885 7502 Srm—Immunoglobulina E antipol·len d'Ulmus americana; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L11685 8578 Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Zea mays; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L87585 7181 Srm—Immunoglobulina E anti-Polistes rPol d 5 (i210); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L63285 7885 Srm—Immunoglobulina E antiprotamina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

W34885 8613 Srm—Immunoglobulina E anti-Proteïna LTP (Blat) rTri a 14 (f433); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L40885 8827 Srm—Immunoglobulina E anti-Prunus domestica (pruna); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L86085 7151 Srm—Immunoglobulina E anti-Prunus persica rPru p 3 (f420); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W93485 7152 Srm—Immunoglobulina E anti-Prunus persica rPru p 7 (f454); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L53285 8598 Srm—Immunoglobulina E antirovell d'ou de Gallus gallus (gallina); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L57985 8831 Srm—Immunoglobulina E anti-Sardina pilchardus (sardina); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L40585 8081 Srm—Immunoglobulina E anti-sègol (Secale cereale); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (18-24) °C; ≤ 7 dies□□(2-8) °C□□;
(indica com conservar la mostra) □≤ 30 dies a □□(-20) °C

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L34685 7765 Srm—Immunoglobulina E antiserum de Gallus gallus; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L42185 8829 Srm—Immunoglobulina E anti-Spinaca oleracea (espinac); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L55485 8595 Srm—Immunoglobulina E anti-Thunnus thynnus (tonyina); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L31085 8116 Srm—Immunoglobulina E anti-Thyrophagus putreus; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L94285 8002 Srm—Immunoglobulina E anti-Tragacant (Astragalus gummifer); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP:*	*10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores□□ a (18 - 24) ºC; ≤ 7 dies□□ a (2 – 8) ºC; ≤ 30 dies □□a (-20) °C
(indica com conservar la mostra)

L77785 7135 Srm—Immunoglobulina E anti-Tropomiosina recombinant de gamba rPen a 1 (f351); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L47585 8593 Srm—Immunoglobulina E antitubercle de Solanum tuberosum (patata); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

L59885 8143 Srm—Immunoglobulina E antiverí d'Apis mellifera; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L60085 8145 Srm—Immunoglobulina E antiverí de Polistes spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L59985 8144 Srm—Immunoglobulina E antiverí de Vespula spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L87485 7182 Srm—Immunoglobulina E anti-Vespula rVes V5 (i209); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L42785 8014 Srm—Immunoglobulina E anti-Acàcia (goma aràbiga)(Acacia spp.); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L32685 8091 Srm—Immunoglobulina E antialbúmina sèrica de gat (e220); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L63785 8020 Srm—Immunoglobulina E anti-Alfa-amilasa; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L90185 8040 Srm—Immunoglobulina E anti-Alfa-Gal (Galactosa-alfa-1,3-galactosa)(o215); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L75985 7167 Srm—Immunoglobulina E anti-Alternaria alternata rAlt a1 (Rm229); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L37885 8009 Srm—Immunoglobulina E anti-Anacardium occidentale (Anacard); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

L74485 8032 Srm—Immunoglobulina E anti-Betula verrucosa rBet v 1 (bedoll berrugós); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L64485 8022 Srm—Immunoglobulina E anti-Bromelina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L89285 8037 Srm—Immunoglobulina E anti-Arachis hypogaea rAra h 1 (cacauet); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L89385 8033 Srm—Immunoglobulina E anti-Arachis hypogaea rAra h 2 (cacauet); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L62585 8024 Srm—Immunoglobulina E anti-Cefaclor; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L78685 8025 Srm—Immunoglobulina E anti-Clorhexidina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L56685 8013 Srm—Immunoglobulina E anti-Extracte de cotxinilla (Dactylopius coccus); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L37085 8008 Srm—Immunoglobulina E anti-Fagopyrum esculentum (Fajol); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L64885 8021 Srm—Immunoglobulina E anti-Formaldehid; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L62685 8028 Srm—Immunoglobulina E anti-Gelatina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L89085 8041 Srm—Immunoglobulina E antigos rCan f5 (e226); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L43085 8015 Srm—Immunoglobulina E anti-Guar (Cyamopsis tetragonolobus); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L37485 8007 Srm—Immunoglobulina E anti-Guixa (Lathyrus sativus); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L79385 7197 Srm—Immunoglobulina E anti-Làtex rHev b8 (k221); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L79285 7194 Srm—Immunoglobulina E anti-Làtex rHev b 6,02 (k220); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L65785 8023 Srm—Immunoglobulina E anti-Lisozima; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L44785 8012 Srm—Immunoglobulina E anti-Llinosa (Linum usitatissimun); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L90285 8039 Srm—Immunoglobulina E anti-parvalbúmina (bacallà) rGad c1 (f426); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L89685 8038 Srm—Immunoglobulina E anti-Platanus acerifolia rPla a1(T241); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L63485 8027 Srm—Immunoglobulina E anti-succinilcolina (Suxamethonium); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210)	*Codi SAP:*	*10014965*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP:*	*10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L61685 8017 Srm—Immunoglobulina E anti-Tàvec (Tabanus spp.); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L37585 8011 Srm—Immunoglobulina E anti-Lupinus albus (Tramús); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L78585 8019 Srm—Immunoglobulina E anti-Vespa (Polistes dominulus); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L60385 8018 Srm—Immunoglobulina E anti-Vespa (Vespa cabro); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L15485 8350 Srm—Immunoglobulina E barreges anti-Ambrosia elatior, Art.absinthum, Plantag lanceolata, Chenop.album, Salsola kali; c.arb.

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	0,1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*
Condicions d'obtenció de la mostra			
Tractament de la mostra	Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari si cal.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]		

L58385 8312 Srm—Immunoglobulina E barreges anti-Bacallà, gamba, musclo, tonyina, salmó; c.arb.

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	0,1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*
Condicions d'obtenció de la mostra			
Tractament de la mostra	Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari si cal.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L50485 8310 Srm—Immunoglobulina E barreges anti-Cacauet, avellana, nou Brasil, ametlla, coco; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L50685 8314 Srm—Immunoglobulina E barreges anti-Clara ou, llet vaca, bacallà, blat, cacauet, soja; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L12385 8340 Srm—Immunoglobulina E barreges anti-Dactylis glomerata, Festuca elatior, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis; c.arb.

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	0,1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*
Condicions d'obtenció de la mostra			
Tractament de la mostra	Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari si cal.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]		

L52585 8316 Srm—Immunoglobulina E barreges anti-Kiwi, meló, plàtan, préssec, pinya; c.arb.

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	0,1 mL
Preparació pacient	—		
Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP:*	*10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP:*	*10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*
Condicions d'obtenció de la mostra			
Tractament de la mostra	Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari si cal.		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L68885 8370 Srm—Immunoglobulina E barreges anti-Mescla d'al·lèrgens inhalants (cribratge); c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L30085 8330 Srm—Immunoglobulina E barreges anti-Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Alternaria; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L75885 8360 Srm—Immunoglobulina E barreges anti-Quercus alba, Ulmus americana, Pl.acerifolia, Salix caprea, Populus deltoides; c.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

NO en té 7054 Srm—Immunoglobulina E específiques barreges d'al·lèrgens; c.arb.(negatiu, positiu)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K07185 7290 Srm—Immunoglobulina G; c.massa (immunoturbidimetria)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 mesos a (15-25) ºC; ≤ 8 mesos a (2-8) ºC; ≤ 8 mesos a (-15 a -25) ºC
(indica com conservar la mostra)

K07144 7297 LCR—Immunoglobulina G; c.massa

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari. Un cop transferit , conserveu la mostra a -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K00344 7008 LCR—Immunoglobulina G (bandes oligoclonals); tàxon(tipificació)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,03 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Recordeu que, per poder fer aquesta anàlisi, la moatra de LCR ha d'anar acompanyada d'una mostra de sèrum.

Tractament de la mostra Transferiu des del recipient primari al tub cònic de plàstic de 10 mL (amb buit) (codi SAP 10013978) i centrifugueu a 2 000 g durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu el sobrenedant al recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

K00385 7357 Srm—Immunoglobulina G (bandes oligoclonals); tàxon(tipificació)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L79985 7361 Srm—Immunoglobulina G anti-Alternaria alternata; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L80285 7367 Srm—Immunoglobulina G anti-Cladosporium; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L58485 8932 Srm—Immunoglobulina G anti-lloro (proteïnes sèriques, plomes, excrements); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

L80785 8931 Srm—Immunoglobulina G anti-Penicillium; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L87085 7370 Srm—Immunoglobulina G anti-Stachybotrys atra; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K06385 8743 Srm—Immunoglobulina G crioprecipitant (turbidimetria); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive 16x100 mm (ref. 455001) *Codi SAP: 10014637*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra S'extreuen dos tubs de 9 mL cadascun (Tub Vacuette de 9 mL, de plàstic, sense additius) i es deixa coagular durant 1 hora dintra una estufa a 37°C. Aquest procés es realitza a l'Àrea d'Immunologia, on també es centrifuga amb la centrífuga MA04, a 4.000 r.p.m. i 37ºC durant 10 minuts.
El sèrum obtingut del sobrenadant es traspassa a un tub de vidre de 25 mL de capacitat i fons cònic i es tapa amb parafilm. S'identifica aquest tub amb una etiqueta numèrica (amb el número de laboratori) i es retola sobre el tub la data i el volum total de sèrum obtingut (mínim 5 mL). A continuació es col·loca aquest tub a 4°C en la nevera MA30, en una gradeta marcada amb el nom "Crioglobulines".
NOTA: Per a anàlisis diferides, el tub secundari pot ser un tub de plàstic convencional, emmagatzemat en nevera (2-8) ºC.

Tractament de la mostra Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

II32385 4777 Srm—Immunoglobulina G Kappa; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 21 dies a (2-8) ºC [7]; > 21 días a ≤ -20 ºC o a temperatura inferior (no congelar i descongelar els sèrums més d'una vegada)

IGGK/IGG 4782 Srm—Immunoglobulina G Kappa/Immunoglobulina G Lambda; raó massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) —

II32485 4778 Srm—Immunoglobulina G Lambda; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 21 dies a (2-8) ºC [7]; > 21 días a ≤ -20 ºC o a temperatura inferior (no congelar i descongelar els sèrums més d'una vegada)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K03885 7320 Srm—Immunoglobulina G1; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipients secundari i congeleu a ≤ -20ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 dies a (2-8) ºC; > 8 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K03985 7321 Srm—Immunoglobulina G2; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipients secundari i congeleu a ≤ -20ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 dies a (2-8) ºC; > 8 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K04085 7322 Srm—Immunoglobulina G3; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (2-8) ºC; > 8 dies a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

K04185 7323 Srm—Immunoglobulina G4; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (2-8) ºC; > 8 dies a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L80985 8049 Srm—Immunoglobulina G4 Alfa-Lactoalbúmina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-24) °C; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

L81185 8048 Srm—Immunoglobulina G4 anticaseïna; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-24) °C; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

L85685 8046 Srm—Immunoglobulina G4 anticlara d'ou; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-24) °C; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L88685 8047 Srm—Immunoglobulina G4 antirovell d'ou; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-24) °C; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L90085 8042 Srm—Immunoglobulina G4 antiverí d'abella (Apis mellifera); c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L87185 8043 Srm—Immunoglobulina G4 antiverí de Polistes spp; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L89985 8045 Srm—Immunoglobulina G4 antiverí de Vespa (Polistes dominulus); c.subst.arb

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

L89885 8044 Srm—Immunoglobulina G4 antiverí de Vespula spp; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L81085 8050 Srm—Immunoglobulina G4 Beta-Lactoalbúmina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-24) °C; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

K07285 7292 Srm—Immunoglobulina M; c.massa (immunoturbidimetria)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 mesos a (15-25) ºC; ≤ 4 mesos a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a (-15 a -25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K06485 8745 Srm—Immunoglobulina M crioprecipitant (turbidimetria); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive 16x100 mm (ref. 455001) *Codi SAP: 10014637*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra S'extreuen dos tubs de 9 mL cadascun (Tub Vacuette de 9 mL, de plàstic, sense additius) i es deixa coagular durant 1 hora dintra una estufa a 37°C. Aquest procés es realitza a l'Àrea d'Immunologia, on també es centrifuga amb la centrífuga MA04, a 4.000 r.p.m. i 37ºC durant 10 minuts.
El sèrum obtingut del sobrenadant es traspassa a un tub de vidre de 25 mL de capacitat i fons cònic i es tapa amb parafilm. S'identifica aquest tub amb una etiqueta numèrica (amb el número de laboratori) i es retola sobre el tub la data i el volum total de sèrum obtingut (mínim 5 mL). A continuació es col·loca aquest tub a 4°C en la nevera MA30, en una gradeta marcada amb el nom "Crioglobulines".
NOTA: Per a anàlisis diferides, el tub secundari pot ser un tub de plàstic convencional, emmagatzemat en nevera (2-8) ºC.

Tractament de la mostra Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

II32585 4779 Srm—Immunoglobulina M Kappa; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 21 dies a (2-8) ºC [7]; > 21 días a ≤ -20 ºC o a temperatura inferior (no congelar i descongelar els sèrums més d'una vegada)
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

IGMK/IGM 4783 Srm—Immunoglobulina M Kappa/Immunoglobulina M Lambda; raó massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

II32685 4780 Srm—Immunoglobulina M Lambda; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 21 dies a (2-8) ºC [7]; > 21 días a ≤ -20 ºC o a temperatura inferior (no congelar i descongelar els sèrums més d'una vegada)
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q34685 3539 "Índex de saturació de la transferrina"

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]: ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

W30161 3155 Pac—Índex predictiu de fibrosi hepàtica: Fibrosi-4 (FIB-4); prop.arb.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** —

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Recordeu que per obtenir aquest càlcul es requereixen els dos tubs primaris corresponents a la magnitud:
T24-GEL 8,5 mL VERMELL
T14-EDTA K3 3 mL LILA (HEMO)

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud Per a ALT: ≤ 3 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 1 setmana a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
Per a AST: ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
Per a PLAQ: ≤ 1 dia a (15-25) ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W20885 7886 Srm—Infliximab;c.massa(CLIA)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)	*Codi SAP: 10024976*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm	*Codi SAP: 10014790*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a temperatura ambient; ≤ 8 dies a nevera (2-8) ºC; > 8 dies a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

K02666 8979 Pla—Inhibidor C1 esterasa del complement (activitat)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari	Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329)	*Codi SAP: 10007915*
Recipient primari (alternatiu)	(LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau)	*Codi SAP: 10028700*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm	*Codi SAP: 10014982*
Recipient secundari	Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557)	*Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Les mostres en contenidor primari es poden conservar i transportar al laboratori en el menor temps possible a temperatura ambient.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari i congeleu immediatament. Es necessiten 2 alíquotes. Conserveu-les a ≤-20ºC. Envieu les mostres congelades.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 hores a temperatura ambient; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K02585 7026 Srm—Inhibidor de la C1-esterasa del complement; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 dies a (2-8) ºC [7], ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

C01566 1839 Pla—Inhibidor de la plasmina; c.subst.arb.(enz.)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 2,5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu immediatament a 1 500 g durant 15 min a (15-25) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari i congeleu immediatament. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 mesos a ≤ -20 °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q34985 4272 Srm—Inhibina B; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 mesos a ≤ -20 °C
(indica com conservar la mostra)

Q35185 3232 Srm—Insulina; c.subst. (IRP 66/304)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8]. En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra També es pot utilitzar plasma amb heparina, però no amb EDTA.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 48 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ (-15 a -25) ºC [7]. Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

KK00285 73360 Srm—Interferó γ

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 60 dies a (-20) °C
(indica com conservar la mostra)

I81572 7338 Sang—Interferó γ (en resposta a l'activació) (citometria); c.subst.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T809-Control HEP.Na 6 mL VERD (SUB).
NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

II30544 4805 LCR—Interleucina-10; c.massa

Tipus de mostra LCR **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (18-24) °C; ≤ 7 dies a (2-8)°C; ≤ 1 mes a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K04485 7333 Srm—Interleucina-10; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 30 dies a ≤ -20 °C; ≤ 6 mesos a □≤ -80 °C
(indica com conservar la mostra)

I82172 8702 Sang—Interleucina-12 (en resposta a l'activació) (citometria); c.subst.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T809-Control HEP.Na 6 mL VERD (SUB).
NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

K07885 7330 Srm—Interleucina-5 (IL-5); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 30 dies□ a ≤ -20 °C
(indica com conservar la mostra)

K04685 7329 Srm—Interleucina-6; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 hores a (20-25) ºc; ≤ 24 hores a (2-8) ºc; ≤ 3 mesos a ≤ -20ºC
(indica com conservar la mostra)

Q35275U 9141 "Perfil ló calci", expressat per: Pla—ló calci; c.subst. I Pla—ló calci; c.subst.(pH 7,40)

Tipus de mostra CàlALI **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q35266U 9139 Pla—ló calci; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 UI/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 UI/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]: ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q35385U 9669 Srm—ló liti; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [7]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC i 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q35385 3766 Srm—ló liti; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari	Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10010742*
Recipient primari	Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10010742*
Recipient primari	(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10016363*
Recipient primari (alternatiu)	(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10006094*
Recipient primari (alternatiu)	(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP: 10006094*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm	*Codi SAP: 10014632*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Apuntar l'hora d'extracció de la mostra i l'hora de la darrera dosi.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC i 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q35485 3166 Srm—ló potassi; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q35466U 9202 Pla—ló potassi; c.subst.(potenciometria directa)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 UI/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 UI/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha d'extreure la mostra utilitzant la xeringa Rapidlyte especifíca. Quan arriba la mostra AL laboratori, s'ha de processar immediatament (en un temps màxim de 15 minuts). En cas contrari s'ha d'emmagatzemar entre (4 - 8) ºC

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 minuts a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q35458 3977 Uri—ló potassi; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* *--*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra és recollida des de la UCI.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 45 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 2 mesos a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 año a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q35448 4055 LPt(Diàlisi)—ló potassi; c.subst.

Tipus de mostra Líquid peritoneal **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP:* *10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q35466U 9083 Pla—ló potassi; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP:* *10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [305].
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q35458U 9094 Uri—ló potassi; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 mesos a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Q35400 3407 Líquid—ló potassi; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP:* *10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(Indica com conservar la mostra)

Q35400U 9151 Líquid—ló potassi; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP:* *10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q96258 3989 Uri—ló potassi / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra	Càlcul	**Volum mínim**	
Preparació pacient			
Recipient primari	Recipient subministrat per l'usuari	*Codi SAP:*	*--*
Recipient secundari	Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic	*Codi SAP:*	*10013978*
Condicions d'obtenció de la mostra	La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí		
Tractament de la mostra	Transferiu al recipient secundari		
Estabilitat de la magnitu	≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]		

(Indica com conservar la mostra)

Q35585 3163 Srm—ló sodi; c.subst.

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	—
Preparació pacient	En dejú de 9 hores [8].		
Recipient primari	Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10010742*
Recipient primari	(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10016363*
Recipient primari (alternatiu)	(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10006094*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014632*
Condicions d'obtenció de la mostra	—		
Tractament de la mostra	Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.		
Estabilitat de la magnitu	≤ 2 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]		

(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q35558 3976 Uri—ló sodi; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra és recollida des de la UCI.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 45 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 45 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [323]
(Indica com conservar la mostra)

Q35548 4054 LPt(Diàlisi)—ló sodi; c.subst.

Tipus de mostra Líquid peritoneal **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP:* *10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu —
(Indica com conservar la mostra)

Q35566U 9201 Pla—ló sodi; c.subst.(potenciometria directa)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 UI/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 UI/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP:* *10024775*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 minuts a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (4-8) ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q35566U 9084 Pla—ló sodi; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP:* *10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].
(indica com conservar la mostra)

Q35558U 9095 Uri—ló sodi; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 45 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q62658 3988 Uri—ló sodi / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q35500 3406 Líquid—ló sodi; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q35500U 9150 Líquid—ló sodi; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W68585 3739 Srm—Isavuconazol; c.massa (HPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 setmanes a (18-24) °C; ≤ 3 mesos a (2-8) °C. Enviament refrigerat.
(indica com conservar la mostra)

Y09372 1012 San—Isoaglutininas ABO; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient Dejú de 8 hores.

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (18-24) ºC; ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W34785 3752 Srm—Itraconazol; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient En dejú.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (18-24) ºC; ≤ 48 hores a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

W32685 4501 Srm—Lacosamida; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q36166U 9085 Pla—Lactat; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette amb Fluorur sòdic i oxalat potàssic 75X13mm 4 mL (tap gris) Ref. 454297 *Codi SAP: 10010747*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD Vacutainer amb Fluorur sòdic i oxalat potàssic 75X13mm 5 mL (tap gris) *Codi SAP: 10007929*

Recipient primari (alternatiu) (PF) Tub Vacuette tap gris de 2 mL amb Fluorur Na i oxalat K 13x75 mm (ref. 454238) *Codi SAP: 10014644*

Condicions d'obtenció de la mostra Es necessiten unes condicions d'extracció de la sang especiALs, evitant que l'estasi venós sigui superior a 30 segons.

Tractament de la mostra Manipuleu l'espècimen amb ALra ja que la suor conté concentracions elevades de lactat. Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (4-8) ºC [10]; ≤ 3 dies a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q36047 3424 LPe—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.

Tipus de mostra Líquid pericàrdic **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q36085 3427 Srm—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 setmanes a a -20ºC [7].
(indica com conservar la mostra)

Q36043 3423 LAs—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q36049 3422 LPl—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q36051 3421 LSi—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.

Tipus de mostra Líquid sinovial **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q36043U 9689 LAs—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Aquesta mostra s'ha d'acompanyar d'una mostra de plasma, per poder realitzar el quocient

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205]; també es pot conservar a (2-8) ºC, però no es pot congelar [49].
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q36066U 9690 Pla—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Aquesta mostra només s'obté per al càlcul del quocient amb líquid ascític.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºc

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205]
(indica com conservar la mostra)

W12143U 9691 LAs—l-Lactat-deshidrogenasa / Pla—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.rel.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Vegeu magnituds individuALs

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Q36049U 9693 LPl—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat (urgent)

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** —

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra Toracocentesi

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q36047U 9694 LPe—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra Líquid pericàrdic **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 2 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205]; també es pot conservar a (2-8) ºC, però no es pot congelar [49].

Q36285 4267 Srm—Lamotrigina; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H10872 1156 San—Leucòcits; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10872U 9019 San—Leucòcits; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

NO en té 1003 San—Leucòcits; morfologia

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q69885 3769 Srm—Levetiracetam; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(Indica com conservar la mostra)

H11140U 9066 San—Limfòcits; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H11240U 9024 Lks(San)—Limfòcits; fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(Indica com conservar la mostra)

H11140 1183 San—Limfòcits; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

H11240 1182 Lks(San)—Limfòcits; fr.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

I75300 8715 San—Limfòcits B (CD19+); c.nom.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment, poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres 48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(Indica com conservar la mostra)

I95172 8711 San—Limfòcits B (CD19+); c.nom.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment, poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres 48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(Indica com conservar la mostra)

I75200 8714 Lfs(San)—Limfòcits B CD19; fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment, poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres 48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

I11672 7079 Lfs(San)—Limfòcits B CD19; fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment, poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres 48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I47872 8065 Lfs(San)—Limfòcits CD95; fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

I75672 8712 Lfs(San)—Limfòcits NK (CD3- CD16+ CD56+); fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment, poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres 48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(Indica com conservar la mostra)

I74800 8716 Lfs(San)—Limfòcits NK (CD3- CD16+ CD56+); fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment, poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres 48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(Indica com conservar la mostra)

I95272 8713 San—Limfòcits NK (CD3- CD16+ CD56+); c.nom.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment, poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres 48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

II30072 8724 Lfs(San)—Limfòcits T (CD3+ CD4- CD8lo/-); fr.nom.

Tipus de mostra Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

I89172 8709 San—Limfòcits T (CD3+); c.nom.

Tipus de mostra Càlcul

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment, poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres 48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

NO en té 7601 Lfs(San)—Limfòcits CD2CD56; fr.nom.

Tipus de mostra Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

I89772 7787 Lfs(San)—Limfòcits CD3CD28; fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

I89372 7072 San—Limfòcits T col·laboradors (CD3+ CD4+); c.nom.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment, poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres 48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I91372 7611 Lfs(San)—Limfòcits CD8CD56; fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

I89572 8710 San—Limfòcits T citotòxics (CD3+ CD8+); c.nom.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment, poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres 48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

NO en té 7609 Lfs(San)—Limfòcits CD4CD29 / Limfòcits CD4CD45RA; raó nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

NO en té 7607 Lfs(San)—Limfòcits CD4CD45RO / Limfòcits CD4CD45RA; raó nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

I90772 7043 Lfs(San)—Limfòcits CD8CD11b; fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

W58585 3812 Srm—Linezolid; c.massa(HPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de la mostra ha de ser predosi. [S'ha de fer constar l'hora d'extracció i l'hora de la darrera dosi]
Posar a -80 ºc o, en el seu defecte:
1) a -20 ºc;
2) a (2 - 8) ºc (no més d'1 dia);
3) a (20 - 25) ºc (no més de 2 hores).

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ 80 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (20-25) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a (-72 a-78) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q25725 3570 Fae(seca)—Lípid; prop.arb.

Tipus de mostra Femta **Volum mínim** 10 g

Preparació pacient Durant 5 dies, pendre una dieta de contingut equilibrat en greixos. No pendre ni purgants ni laxants.

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Condicions d'obtenció de la mostra Femta de mescla homogènia de 24 h (indicar pes). Si la recollida es fa durant 3 dies consecutius, indicar-ho. El pacient ha de procurar no barrejar la femta amb orina.

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra refrigerada (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (2-8)°C; ≤ 2 mesos a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

Q36985 3921 Srm—Lipoproteïna(a); c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se plasma amb heparina de sodi i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]; > 2 dies a (-70) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W60085 3920 Srm—Lipoproteïnes plasmàtiques, estudi per RMN

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Deixar reposar la mostra durant 30 min, en posició vertical. Centrifugueu a 1600 g, durant 10 min, a 14 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q71343U 9112 Pac—Líquid ascític; pH

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP: 10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q71349U 9116 Pac—Líquid pleural; pH

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 UI/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 UI/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP: 10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q37685 3689 Srm—Lutropina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q37785 3476 Srm—Magnesi(II); c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Eviteu el contacte prolongat del sèrum amb el coàgul per l'elevada concentració eritrocitària de magnesi(II). Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q37766U 9048 Pla—Magnesi(II); c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q97058 3996 Uri—Magnesi(II) / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(Indica com conservar la mostra)

Q37885 4338 Srm—Manganès; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP:* *10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP:* *10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP:* *10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 28 dies a (2-8)°C
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q38472 4256 San—Mercuri; c.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció al final de setmana laboral

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 28 dies a (2-8)°C
(indica com conservar la mostra)

Q97258 4257 Uri—Mercuri / Creatinini; raó massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina recent, abans de la jornada laboral

Tractament de la mostra Transferiu la mostra al recipient secundari. Afegiu 0,1 mL d'àcid nítric concentrat, per cada 5 mL d'orina, (ho trobareu a Bioquímica Especial) al recipient que enviarem (sota campana). Barrejeu.

Estabilitat de la magnitu ≤ 14 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W32766 3798 Srm—Meropenem; c.massa(HPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ 80 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 h (20 - 25) ºC; ≤ 24 h (2 - 8) ºC; ≤ 6 mesos (-72 - (-78)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)

Q98858 3772 Uri—Metadona; c.arb. (metadona; immunoanàlisi; no urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient El pacient, quan s'aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra més adequada és l'orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q98858U 9712 Uri—Metadona; c.arb. (metadona; immunoanàlisi; urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q76775U 9120 Hb(San)—Metahemoglobina; fr.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 UI/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 UI/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP:* *10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP:* *10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (2-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

N08558 4458 Uri—Metilmalonat / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient —

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal i conserveu a ≤-20 ºC, abans de les 2 h de l'extracció. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 mesos a (-20 a -16) ºc
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q39185 3774 Srm—Metotrexat; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]: ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Q39144 3773 LCR—Metotrexat; c.subst.

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]: ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q39166U 9103 Pla—Metotrexat; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu a recipient propi de l'anALitzador

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

II02472 7088 Perfil "limfocitari avançat B" compost de:

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a temperatura ambient
(indica com conservar la mostra)

Q39366 3945 Pla—Micofenolat; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [10]; ≤ 11 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q08285 3917 Srm—beta2-Microglobulina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC [7]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7].
(Indica com conservar la mostra)

H11340U 9249 San—Monòcits; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H11440U 9250 Lks(San)—Monòcits; fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

H11340 1185 San—Monòcits; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H11440 1184 Lks(San)—Monòcits; fr.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q34058 8615 Uri—N-Acil-Histamina / creatinina; quocient massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal i congeleu inmediatament. Conserveu a ≤-20 ºc. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 h a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

H10940U 9072 San—Neutròfils(segmentats); c.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP:* *10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10940 1181 San—Neutròfils(segmentats); c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP:* *10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H11040U 9023 Lks(San)—Neutròfils(segmentats); fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

H11040 1180 Lks(San)—Neutròfils(segmentats); fr.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q65785 3544 Srm—Nicotinamida; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 mesos a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

Q34166 8513 Pla—N-Acil-Histamina; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari i congeleu immediatament. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q00885 3460 Srm—5'-Nucleotidasa; c.cat.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8)°C; ≤ 14 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q41158 3780 Uri—Opiacis; c.arb. (morfina; immunoanàlisi; no urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient El pacient, quan s'aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra més adequada és l'orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q41158U 9713 Uri—Opiacis; c.arb. (morfina; immunoanàlisi; urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q41361U 9221 Pac—Orina; osmolalitat (urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q41361 3122 Pac—Orina; osmolalitat (no urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient El pacient, quan s'aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP:* *10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP:* *10017357*

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP:* *10002525*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra més adequada és l'orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [323]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q41785 3462 Srm—Osteocalcina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8]

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra En els pacients en tractament amb altes dosis de biotina (més de 5 mg/dia), l'extracció no hauria de realitzarse abans de les 8 hores desprès de l'última administració.
La mostra de sèrum s'ha de centrifugar immediatament perquè els eritròcits contenen proteases que degraden l'osteocalcina. Les mostres de plasma són més estables.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (15-25) ºC [7]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

GG55911 4512 DNA(San)—Osteogènesi imperfecta dominant (gen COL1A2)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a temperatura ambiente (15-25) ºC; ≤ 4 dies refirgerada (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

N03885 4605 Srm—Oxalat; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2 - 8) ºC.Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 hora a (15-25) °C; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q42085 3770 Srm—Oxcarbazepina+10-hidroxicarbazepina; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q71273U 9129 Gas(aSan)—Oxigen; pr.parc.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 UI/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 UI/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP: 10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardar-lo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 45 minuts a (0-3,9) ºC [221]; ≤ 15 minuts a (4-25) ºC [221]
(indica com conservar la mostra)

Q71275U 9005 Gas(vSan)—Oxigen; pr.parc.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 UI/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 UI/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP: 10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardar-lo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 45 minuts a (0-3,9) ºC [221]; ≤ 15 minuts a (4-25) ºC [221]
(indica com conservar la mostra)

Q42266U 9104 Pla—Paracetamol; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de l'espècimen ha de ser AL menys 4 hores després de l'administració del fàrmac (estat estacionari).

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC [7]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W14866 9230 Perfil "Paratirina (mesures intraoperatòries hiperparatiroidisme)" compost de:

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) ºC [7]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [7] ; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

W19166 9231 Perfil "Paratirina (mesures intraoperatòries tiroidectomia)" compost de:

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) ºC [7]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [7] ; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q42785 3479 Srm—Paratirina; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Conserveu la mostra a (2-8) ºC (excepte si la mostra s'ha de mesurar passades 48 h, que haureu de conservar a ≤-20 ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 hores a (15-25) ºC [7]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

W71466 9232 Pla—Paratirina (postoperatoria); c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) ºC [7]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [7] ; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q43185 3251 Srm—Pèptid C; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra També es pot utilitzar tubs de plasma amb heparina, EDTA, citrat o oxalat com a anticoagulants.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 1 dia a (15-25) ºC [260]; ≤ 120 hores a 4 ºC [260] ≤ 120 hores a ≤ -20 ºC [260] (En cas d'emprar mostra de plasma es manté l'estabilitat 36 hores a temperatura ambient)

Q43485 3181 Srm—Peptidil-dipeptidasa A; c.cat.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W81185 4459 Fae—Pèptids immunogènics del gluten (GIP); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra Femta **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap blau no estèril amb transferència de buit. BD Vacutainer *Codi SAP: 10002525*

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP: 10002186*

Recipient primari (alternatiu) Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb tap groc amb transferència de buit. (SAP ANTIC 10017357) *Codi SAP: 10017357*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

W32885 4502 Srm—Perampanel; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-30) ºC [208]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [208]; ≤ 1 any a -20 ºC [208]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A06544 8519000 Perfil "Anticossos antigangliòsids (IgG i IgM) en LCR" compost de:

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A06585 8505000 Perfil "Anticossos antigangliòsids (IgG i IgM) en sèrum" compost de:

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

II31872 8941 Perfil "Detecció d'Interferó-Gamma en resposta a CMV (ELISPOT)"

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 12 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 32 hores a temperatura ambient. No refrigerar, no congelar.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

N02285 4283 Perfil esterols (sèrum)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Adjuntar HC.

Tractament de la mostra Centrifugueu en les 2 primeres hores desprès de l'extracció, a (2 000-2 100) g durant 10 minuts a (18-22) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari i congeleu immediatament. Preserveu de la llum. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 dies a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

I95072 8703 Perfil-Poblacions Limfocitàries (CD3/CD4/CD8/CD19/CD56)-Sang (T48BNK)(citometria de flux)

Tipus de mostra **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a temperatura ambient. No s'han de refriigerar.
(Indica com conservar la mostra)

I90072 7599 Perfil bàsic de subpoblacions limfocitàries T (VIH) compost de:

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra No s'ha de guardar en frigorific.

Tractament de la mostra La mostra pot ser tractada amb conservant per a periodes més llargs d'emmagatzematge.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a temperatura ambient
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

A53985 7002 Perfil anticossos paranodals en sèrum

Tipus de mostra **Volum mínim** 0,5mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC,

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia (18 - 24)°C ; > 1 dia (- 20)°C
(indica com conservar la mostra)

N03058 3829 Perfil glucosaminoglicans (orina)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9 Ml

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 dies (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

W50348 4053 LPt(Diàlisi)—Perfil ions

Tipus de mostra Líquid peritoneal **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

II02072 7492 Perfil limfocitari avançat RET

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-30) °C. La mostra no es pot conservar en fred.
(indica com conservar la mostra)

II02172 7491 Perfil limfocitari avançat T+TH

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (18-30) °C. La mostra no es pot conservar en fred.
(indica com conservar la mostra)

II25017 8735 Perfil Limfòcits intraepitelials (mucosa gàstrica)

Tipus de mostra **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tubs cónics estèrils de 15 ml Nunc *Codi SAP: 10031138*

Condicions d'obtenció de la mostra Biopsia de duodè en pot estèril amb medi de cultiu complet.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu La biopsia de duodé en medi de cultiu complet 4h a temperatura ambient, en medi líquid (PBS o medi de cultiu). Si no s´analitza immediatament es deixa en el pot de medi liquid fins el seu proces, no mes de 24h.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

II02372 8749 Perfil limfòcits T col·laboradors (Th)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 4 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra no es pot conservar en fred.
NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a □(18-30) °C
(indica com conservar la mostra)

II02272 8739 Perfil limfòcits T reguladors

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra pot ser tractada amb conservant per a períodes més llargs d'emmagatzematge.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

GT02911 4753 Perfil-Estudi genètic de les atàxies hereditàries (estudi seqüencial expansions)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Sang:< 24 hores a temperatura ambient [10]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H24272 1008 Perfil-Hemograma sense diferenciació

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H24272U 9058 Perfil-Hemograma sense diferenciació (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W70944 3937 Perfil-Marcadors Alzheimer en LCR

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tubs CSF de 2,5 mL PP-low binding *Codi SAP: 10032074*

Condicions d'obtenció de la mostra
Punció lumbar.
Transport immediatament, després de la seva obtenció, al laboratori d'urgències.
Lliurament de la mostra al facultatiu responsable.
Procediment d'obtenció i preparació de les mostres (aquest apartat és comú per a les 5 magnituds del Perfil) :W70944 Perfil-Marcadors Alzheimer en LCR:
Fer una punció lumbar i realitzar la recollida pel mètode de degoteig, descartant els primers 1-2 ml, i recollir almenys 2,5 ml d'LCR en el tub de baixa adherència Sarstedt 2,5 ml (ref. 63.614.625).
Es recomana mantenir la mostra a 2-8 °C fins al seu processament. En cas que no sigui possible es mantindrà a temperatura ambient (20-25 °C).
Les mostres s'han de temperar abans de processar-les. No és necessària centrifugació ni manipulació prèvia de la mostra abans del seu processament.

Les mostres poden conservar-se fins a 14 dies a 2-8 °C o 5 dies a 20-25 °C.

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (20 - 25) ºC; ≤ 14 dies a (2 - 8) ºC; ≤ 8 setmanes entre (-15 i -25) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

W32966 3799 Srm—Piperacil·lina; c.massa(HPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ 80 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 h (20 - 25) ºC; ≤ 22 h (2 - 8) ºC; ≤ 6 mesos (-72 - (-78)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

N03972 4252 San—Piruvat; c.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub A, subministrat pel laboratori subcontractat (4 mL) (tap blanc) *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra S'han de seguir les instruccions proporcionades pel Laboratori Subcontractat (els tubs subministrats han de conservar-se refrigerats):
Mescleu IMMEDIATAMENT 2 mL de sang (HEPARINA) amb el contingut del tub de 10 mL subministrat (conté 4 mL d'àcid perclòric). Barregeu 30 segons per inversió i deixeu 10 min. en un bany de gel. Centrifugueu 15 min. a 3000g. Separeu 1 mL del sobrenadant i afegiu-lo al tub petit de 5 mL subministrat (conté 100 uL de NaOH 5M). Barregeu per inversió. La mostra resultant ha de ser INCOLORA. Conserveu-la i envieu-la refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a a 2-8 °C; ≤ 6 setmanes a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

H20572U 9035 San—Plaquetes; c.nom.(citrat de sodi; urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP:* *10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP:* *10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP:* *10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H20572 2829 San—Plaquetes; c.nom.(citrat de sodi; no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

H12172U 9022 San—Plaquetes; c.nom.(EDTA K3; urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

H12172 1004 San—Plaquetes; c.nom.(EDTA K3; no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H20972 1006 Plaq(San)—Plaquetes immadures; fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H20972U 9031 Plaq(San)—Plaquetes immadures; fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H12372U 9077 San—Plaquetes; vol.entític ("VPM"; urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H12372 1163 San—Plaquetes; vol.entític ("VPM"; no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q41366U 9220 Pac—Plasma; osmolalitat

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 dia a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q71373U 9132 Pac(aSan)—Plasma; pH

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP: 10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra Si l'espècimen no s'analitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardar-lo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 60 minuts a (0-8) ºC [221]; ≤ 30 minuts a 25 ºC [221]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q71375U 9133 Pac(vSan)—Plasma; pH

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5 UI/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li 23 UI/mL aguj 23G (ref.4698PG) *Codi SAP: 10024775*

Recipient primari (alternatiu) Arterial Blood sampling kit with dry Lithium heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G *Codi SAP: 10028636*

Condicions d'obtenció de la mostra El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardar-lo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 60 minuts a (0-8) ºC [221]; ≤ 30 minuts a 25 ºC [221]
(indica com conservar la mostra)

CO7766 1831 Pla—Plasminogen; c.subst.arb.(coagul.)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 2,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (15-25) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 14 dies a (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q43985 4261 Srm—Plata; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Si s'ha d'enviar més d'una alíquota, transferiu el sèrum al recipient secundari; en cas contrari, envieu el recipient primari centrifugat. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q44072 3380 San—Plom; c.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q44058 4291 Uri—Plom; c.massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina recent

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8)° C. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 14 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q44166 3597 Pla—Polipèptid intestinal vasoactiu; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub Vacuette tap rosa de 4 mL amb EDTA K3+aprotinina 13x75 mm *Codi SAP:* *10000239*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

W00713 3153 Ers(San)—Porfirines; prop.arb.(HPLC)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP:* *10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra Preserveu de la llum

Tractament de la mostra Adjunteu al llistat de la remesa el resultat de la prova San—Eritròcits; fr.vol.("hematòcrit"; no urgent) (H10372)

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC protegit de la llum□□; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC protegit de la llum
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q44358 3154 Uri—Porfirines; prop.arb.(HPLC)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.Transferiu a recipient secundari, preserveu de la llum i refrigereu (2 - 8) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC protegit de la llum☐☐; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC protegit de la llum
(indica com conservar la mostra)

Q44324 3144 Fae(seca)—Porfirines(protoporfirines, coproporfirines, uroporfirines); prop.arb.

Tipus de mostra Femta **Volum mínim** 5 g

Preparació pacient

Recipient primari (alternatiu) Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril *Codi SAP:* *10002186*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu la mostra refrigerada (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC protegit de la llum☐☐; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC protegit de la llum
(indica com conservar la mostra)

W20458 3152 Uri—Porfobilinògen / creatinini; raó massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient —

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC protegit de la llum☐☐; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC protegit de la llum
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W14285 3751 Srm—Posaconazol; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,4 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q53185 7003 Srm—"Prealbúmina"(transtiretina); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,25 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies (20-25) ºC [7]; ≤ 6 mesos (2-8) ºC [7]; ≤ 12 mesos (-20) ºC [7].
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

D042EIAS 3607 Srm—Procalcitonina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a (20-25) ºC [318]; ≤ 24 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

D042EIAS 9294 Pla—Procalcitonina; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a (20-25) ºC [318]; ≤ 24 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q45085 3724 Srm—Progesterona; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q45285 3507 Srm—Prolactina; c.subst.arb. (OMS 3r IS 84/500)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]. Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q45385 3598 Srm—Propèptid aminoterminal del procol·lagen de tipus III; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC, i transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (18-25) ºC [7]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [7]; indefinit a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

W14585 3430 Srm—Pro-Pèptid natriurètic cerebral (1-76); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient Cap

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (20-25) ºC; ≤ 6 dies a (2-8) ºC; 24 mesos a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W14585 9293 Pla—Pro-Pèptid natriurètic cerebral (1-76); c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q46500U 9153 Líquid—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q46543U 9110 LAs—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q46500 3409 Líquid—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q46544U 9118 LCR—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 dies a (20-25) ºC [10];≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q46585 3446 Srm—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 6 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]

Q46566U 9087 Pla—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q46543 3453 LAs—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q46549 3454 LPl—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q46548 4050 LPt(Diàlisi)—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra Líquid peritoneal **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q46549U 9115 LPl—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra Líquid pleurAL **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q46547U 9699 LPe—Proteïna; c.massa (urgent)

Tipus de mostra Líquid pericàrdic **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q97558U 9003993 Uri—Proteïna / Creatinini; raó massa/subst. (urgent)

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q97558 3993 Uri—Proteïna / Creatinini; raó massa/subst.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

D043WBL 3925 LCR—Proteïna 14-3-3; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP:* *10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q56385 5006 Srm—Proteïna A plasmàtica associada a la gestació; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient No necessita condicions especials.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra) ≤ 25 hores a 20-25 ºC i 8 dies a 2-8 °C; ≤ 12 mesos a -20 °C.Transport amb refrigeració habituals evitant l'exposició de les mostres a temperatures elevades (mostres prop de la finestra o font de calor) [7].

Q93985 4802 Srm—Proteïna amiloide A; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal.
Conserveu a (2-8) ºc. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra) ≤ 2 dies a (2-8) ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q97844 4262 LCR—Proteïna beta traça; c.massa

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≥ 7 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

C07966 1827 Pla—Proteïna C; c.subst.arb.(enz.; IS 86/622)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim**

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7]. En cas d'estudi de Trombofília el pacient ha de suspendre el tractament amb antivitamines K, mínim tres setmanes abans de l'extracció.

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q45866U 9088 Pla—Proteïna C reactiva; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8]

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q45885 3900 Srm—Proteïna C reactiva; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra Pot utilitzar-se plasma amb heparina de sodi i EDTA tripotassic.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 mesos a (4-8) ºC [10]; ≤ 3 anys a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q80085 3899 Srm—Proteïna C reactiva; c.massa(CRM 470; "factor de risc coronari")

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 11 díes a (15-25) ºC; ≤ 2 mesos a (2-8) ºC; ≤3 anys a (-15 a -25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q46285 4610 Srm—Proteïna enllaçant del factor de creixement insulínic 3; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (-20)ºC. Envieu la mostra congelada

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (2-8) ºC; ≥ 1 dia a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

W26385 4351 Srm—Proteïna epididimal humana 4 (HE4); c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 hores a (15-25) ºC [7]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 setmanes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q46485 3519 Pla—Proteïna relacionada amb la paratirina; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub Vacuette tap rosa de 4 mL amb EDTA K3+aprotinina 13x75 mm *Codi SAP: 10000239*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (2-8) ºC abans de les dues hores després de l'extracció. Transferiu el plasma al recipient secundari. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 90 dies a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C15466 1399 Pla—Proteïna S (activitat); c.cat.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL plasma (citrat) p

Preparació pacient —

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC (doble centrifugación a 2500 g/15 min.) Aspirar parte superior. CONGELAR INMEDIATAMENTE Y ENVIAR CONGELADO.¡Tubo aparte!

Estabilitat de la magnitu ≤ 30 dies a ≤ -20 °C
(indica com conservar la mostra)

C08366 1398 Pla—Proteïna S(lliure); c.subst.(immunoquím.)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim**

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7]. En cas d'estudi de Trombofília el pacient ha de suspendre el tractament amb antivitamines K, mínim tres setmanes abans de l'extracció.

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q06585 3910 Srm—Proteïna S100; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,05 mL

Preparació pacient En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22)º C. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -20º C fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 5 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 48 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 setmanes a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q46785 3431 Srm—Proteïnes; prop.arb.(electroforesi capil·lar), expressat per:

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 10 dies a (2-8) ºC [7]; ≤1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C03766 1832 Pla—Protrombina; c.subst.arb.(coagul.)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,3 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

L80466 8983 Pla—Prova de transformació limfoblàstica (TTL)

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 20 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (15-25) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

N66966 4801 Pla—Quitotriosidasa; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Recipient primari (alternatiu) Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100 mm (ref. 455045) *Codi SAP: 10000241*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

GE81411 4546 DNA(San)—Re-anàlisi d'exoma dirigit; var.seq.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient Cap.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu Cap.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

I72672 7334 San—Receptor beta1 IL-12 (CD212)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T809-Control HEP.Na 6 mL VERD (SUB)

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 2 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

I55872 7336 San—Receptor I interferó gamma (CD119)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 2 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q94485 3619 Srm—Receptor soluble de transferrina; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 dies a (15-25) ºc [7]; ≤ 15 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 13 setmanes□ a (-25 a -15) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q94066 3172 Pla—Renina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient És convenient que l'extracció es realitzi entre les 8:00 i les 9:00 hores. Els pacients han d'estar en dejú de 9 hores, i en repòs, estirats o almenys asseguts, mitja hora abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra No s'han d'utilitzar tubs de plasma amb heparina, citrat o oxalat com a anticoagulants.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 12 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari i congeleu. Abans d'analitzar, descongeleu la mostra en un bany amb aigua.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

C08766 2993 Pla—“Resistència a la proteïna C activada”; temps rel.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim**

Preparació pacient En dejú de 9 hores [7].

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

I87272 8706 Sang—Resposta limfoproliferativa a anticossos monoclonals (anti-CD3); fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T809-Control HEP.Na 6 mL VERD (SUB).
NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

I86472 8708 Sang—Resposta limfoproliferativa a antígens: candidina; fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de tub i condicions de transport que correspon a l'etiquetaT809-Control HEP.Na 6 mL VERD (SUB).
NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

I87572 8707 Sang—Resposta limfoproliferativa a l'èster de forbol miristat acetat: PMA+ ionomicina; fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1,7 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T809-Control HEP.Na 6 mL VERD (SUB).
NOTA: No es pot derivar al laboratori subcontractat ni divendres, ni vigílies de festiu.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

I86972 8705 Sang—Resposta limfoproliferativa a mitògens: fitohemaglutinina (PHA); fr.nom.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1,7 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub d'extracció de sang al buit 6 i 7 mL, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu.Tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710 *Codi SAP: 10000244*

Recipient primari Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na 16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD Biosciences) *Codi SAP: 10011147*

Condicions d'obtenció de la mostra Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T809-Control HEP.Na 6 mL VERD (SUB)

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H20872U 9401 San—Reticulòcits; prop arb. (urgent), expressat per:

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 72 h a (20-25) ºC [230]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H08372U 9402 San—Reticulòcits; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 72 h a (20-25) ºC [230]
(indica com conservar la mostra)

H14972U 9403 Ers(San)—Reticulòcits; fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

H20872 1001 San—Reticulòcits; prop arb. (no urgent), expressat per:

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 72 h a (20-25) ºC [230]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

H08372 1176 San—Reticulòcits; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 72 h a (20-25) ºC [230]
(indica com conservar la mostra)

H14972 1177 Ers(San)—Reticulòcits; fr.nom. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q48285 4273 Srm—Retinol("Vitamina A"); c.subst.(SRM 968f; UHPLC-UV)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú [7], [172], [173].

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Protegir de la llum.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22)º C. Preserveu de la llum i conserveu a (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 24 hores a temperatura ambient i protegida de la llum [7], [172], [173]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC i protegida de la llum [172], [173]; ≤ 6 mesos a -18 ºC i protegida de la llum [7], [173]; ≤ 15 anys a -70 ºC i protegida de la llum [172]

W33066 1646 Pla—Rivaroxaban; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Nivells vall (administració del fàrmac 24 hores abans de l'extracció). Nivells pic (entre 1-3 h després de prendre el fàrmac).

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ -80ºC. ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 4 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W60385 3948 Srm—Rufinamida; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha de realitzar un extracció pre-dosi.
Es pot fer servir qualsevol tub de sèrum amb gel separador que es faci servir al Laboratori Clínic de l'HUB que s'empri per les anàlisis de rutina. A més, per estalviar una punxada addicional innecessària al pacient, es recomana que es faci una alíquota al RSA sempre i quan, a més d'aquesta magnitud farmacològica, és mesurin altres magnituds bioquímiques.
-☐Per a les mostres que s'obtenen al propi Hospital, una vegada arribin al laboratori, aquestes s'han de centrifugar, aliquotar i emmagatzemar a (2-8) ºC.
-☐Per a les mostres que es reben d'altres centres de salut, les mostres s'han de centrifugar prèviament, transportar-se a temperatura ambient (si triguen menys de 72 h en arribar al laboratori) o a (2-8) ºC (si triguen més de 72 h en arribar al laboratori) i, una vegada arribin al laboratori, s'han d'emmagatzemar a (2-8) ºC. [211]

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu el plasma a un recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(Indica com conservar la mostra)

S290CLIS 19693 Srm—SARS-CoV-2 anticossos totals (anti-N);c.arb

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (☐☐15-25) °C☐☐ [7];☐ ≤ 7 dies a (2-8) °C☐ [7];☐☐☐ ≤ 28 dies a - 20
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

S293CLIS 19704 Srm—SARS-CoV-2 anticossos totals (anti-S);c.arb

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (□□15-25) °C□□ [7];□ ≤ 14 dies a (2-8) °C□ [7];□□□ ≤ 3 mesos a - 2 [7].
(indica com conservar la mostra)

Q48985 4337 Srm—Seleni; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 14 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GG79158 4448 Seqüenciació del DNA mitocondrial en orina (cas índex)

Tipus de mostra orina **Volum mínim** 0,3 mL (volumen míni

Preparació pacient —

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (15-25) °C; ≤ 2 dies□□ a (2-8) °C; 3 mes□□os a (-20) °C
(indica com conservar la mostra)

GG49511 4760 Seqüenciació del DNA mitocondrial en sang (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (Temperatura ambient)□□; ≤ 4 dies a (2 - 8) °C
(indica com conservar la mostra)

GG49611 4759 Seqüenciació del DNA mitocondrial en sang (cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (Temperatura ambient)□□; ≤ 4 dies a (2 - 8) °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q49085 3859 Srm—Serotonina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores (2 - 8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q49361 3121 Pac—Sèrum; osmolalitat

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,05 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 dia a (4-8) ºC [323]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GT02411 5202 DNA(San)—Síndrome de Cornelia de Lange (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GT02511 5201 DNA(San)—Síndrome de Cornelia de Lange (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

W51372 3947 San—Sirolimus; c.massa(UHPLC-MS/MS; no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de la mostra ha de ser predosi. S'ha de fer constar l'hora d'extracció i l'hora de la darrera dosi.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q49566 4342 Pla—Somatostatina; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub Vacuette tap rosa de 4 mL amb EDTA K3+aprotinina 13x75 mm *Codi SAP: 10000239*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari i congeleu immediatament. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q49685 3487 Srm—Somatotropina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores. El pacient ha de mantenir-se en repòs 30 minuts entre la punció i l'extracció de la sang.

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra L'extracció es realitza amb "papallona".

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 8 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN69111 8486 DNA(San)—Sordesa neurosensorial no sindròmica (gen GJB2)(conexina 26)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 4 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)

GN69011 8485 DNA(San)—Sordesa neurosensorial no sindròmica (gen GJB2)(conexina 26)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 4 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)

GN51111 8490 DNA(San)—Sordesa neurosensorial no sindròmica (gen GJB3)(conexina 31)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 4 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN51011 8489 DNA(San)—Sordesa neurosensorial no sindròmica (gen GJB3)(conexina 31)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 4 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)

GN50911 8488 DNA(San)—Sordesa neurosensorial no sindròmica (gen GJB6)(conexina 30)(cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 4 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)

GN50811 8487 DNA(San)—Sordesa neurosensorial no sindròmica (gen GJB6)(conexina 30)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 4 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GT18611 7882 Estudi genètic de la discinèsia ciliar primària (panell)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia (15-25) °C; ≤ 3 dies (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GT28711 7883 Estudi genètic de la discinèsia ciliar primària (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia (15-25) °C; ≤ 3 dies (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Q49885 3620 Srm—Subunitat Alfa-hipofisària; c.subst.arb

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 48 hores a (18-24) °C; ≤ 7 dies a □□(2-8) °C; ≤ 30 dies a ≤□□ -20 °C
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q49985 3657 Srm—Sulfat de deshidroepiandrosterona; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 setmanes a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Q50285 4281 Srm—Sulfonilureas; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Trasferiu el sèrum al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q50258 4282 Uri—Sulfonilureas; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina recent

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 20 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W51172 3600 San—Tacrolimus; c.massa(UHPLC-MS/MS; no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP:* *10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP:* *10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)

G00611 2902 DNA(San)—Talassèmia-α (gens HBA1,HBA2); delecció α 3,7 i mutacions puntauls prevalents

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP:* *10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a 25 ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q50485 4258 San—Tali; c.massa

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 21 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W11558 4259 Uri—Tali / Creatinini; raó massa

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP: --*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP: 10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra Orina recent

Tractament de la mostra Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal.Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 20 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W33166 3800 Srm—Tazobactam; c.massa(HPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu a un recipient secundari i congeleu a ≤ 80 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 h a (20 - 25) ºC [39]; ≤ 24 h a (2 - 8) ºC; ≤ 6 mesos (-72 - (-78)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q50685 4558 Srm—Teicoplanina; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q94285 3463 Srm—C-Telopèptids isomeritzats del col·lagen de tipus I; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Es recomana fer servir mostres de plasma amb EDTA di o tripotàsic ja que es més estable que el sèrum.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i congeleu a ≤ −20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 hores a (20-25) ºC [sèrum]; ≤ 8 hores a (2-8) ºC [sèrum]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [sèrum]
(indica com conservar la mostra)
Plasma amb heparina de litio: ≤ 4 hores a (20-25) ºC; ≤ 8 hores a (2-8) ºC
Plasma amb EDTA di i triptásico: ≤ 24 hores a (20-25) ºC; ≤ 8 dies a (2-8) ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q50885 3763 Srm—Teofil·lina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Q50866U 9105 Pla—Teofil·lina; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de l'espècimen es du a terme abans de l'administració de la següent dosi de fàrmac (vALI).

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W12085 3764 Srm—Teriflunomida; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra els enviaments han d'incloure CLIENT 13118 VIATRIS, perquè el cost ho assumeixi la farmacèutica

Tractament de la mostra —

Estabilitat de la magnitud ≤ 28 dies a (2 – 8) ºC; ≤ 28 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q51185 3652 Srm—Testosterona; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra També es pot utilitzar plasma amb EDTA com a anticoagulant.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a (-25 a -15) ºC [7]. Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q99585 3651 Srm—Testosterona lliure calculada; c.subst. (equació de Vermeulen)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q80972 4268 San—Tiopurina metiltransferasa; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 5 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 6 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q52285 3534 Srm—Tiroglobulina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q52385 3520 Srm—Tirotropina; c.subst.arb.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores.

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 8 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 24 mesos a ≤ (-15 a -25) ºC [7]. Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q52485 3527 Srm—Tiroxina(no unida a proteïna); c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores. En pacient s amb tractament amb hipolipemiants que contenen D-tiroxina s'ha d'interrompre l'administració del fàrmac de 4 a 6 setmanes abans d'obtenir l'espècimen. En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 5 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 30 dies a ≤ (-15 a -25) ºC [7]. Congelar només un cop.

Q52685 3790 Srm—Tobramicina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96]; ≤ 24 hores a (2-8) ºC [96]; ≤ 1 mes -20 ºC [7]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q52644 3789 LCR—Tobramicina; c.massa

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies tapat a (2-8) ºC [7]; ≤ 28 dies tapat a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q03785 3545 Srm—alfa-Tocoferol("Vitamina E"); c.subst.(SRM 968f; UHPLC-UV)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú [7], [172].

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra NOTA: Els valors de la concentració de substància d'alfa-tocoferol en el sèrum no es veuen influenciats per la llum. Tot i això, com que el seu mesurament es durà a terme conjuntament amb el de la concentració de substància de retinol en el sèrum (el qual si que es veu influït), s'ha seleccionat la casella "protegir de la llum" en el supòsit que es sol•licitin conjuntament ambdues magnituds biològiques.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22)º C. Preserveu de la llum i conserveu a (2-8) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a temperatura ambient i protegida de la llum□□ [7],[172]; ≤ 1 setmana□ (2-8) ºC i protegida de la llum □□[172]; ≤ 6 setmanes a -18 ºC i protegida de la llum □□[7],[172]; ≤ 1 any a -70 ºC i protegida de la llum □□[172]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q52785 4500 Srm—Topiramat; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra	Sèrum	**Volum mínim**	0,5 mL
Preparació pacient	El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.		
Recipient primari	Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10010742*
Recipient primari	(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10016363*
Recipient primari (alternatiu)	(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance	*Codi SAP:*	*10006094*
Recipient primari (alternatiu)	(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm	*Codi SAP:*	*10014632*
Recipient secundari	Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO)	*Codi SAP:*	*10000862*
Condicions d'obtenció de la mostra	S'ha de realitzar una extracció pre-dosi. Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a les anàlisis de rutina.		
Tractament de la mostra	Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi		
Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra)	≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]		

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q53085 3546 Srm—Transferrina; c.subst.(CRM 470)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10] ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Q53285 3558 Srm—Triacilglicerol-lipasa; c.cat.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 7 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q53500 3416 Líquid—Triglicèrid; c.subst.

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q53585 3398 Srm—Triglicèrid; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q53543 3403 LAs—Triglicèrid; c.subst.

Tipus de mostra Líquid ascític **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Q53549 3412 LPl—Triglicèrid; c.subst.

Tipus de mostra Líquid pleural **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q53685 4600 Srm—Triiodotironina(no unida a proteïna); c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel separador 13x100 mm *Codi SAP: 10014148*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 5 dies a ≤ -(14-25) ºC [7]; 30 dies a (-25 a -15) ºC [7]. Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)

Q53785 4601 Srm—Triiodotironina inversa (T3 reversa); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient secundari, si cal, i conserveu a (2 - 8) ºC (Excepte si s'ha d'enviar passades 24h que es conservarà i enviarà a -20ºC).

Estabilitat de la magnitu ≤ 24 hores a (2-8) ºC; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q54185 7546 Srm—Triptasa; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Cap

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 7 dies a (2-8) ºC, 2 mesos a (-18 a -22) ºC
(indica com conservar la mostra)

C16772 1822 San—Tromboelastograma; prop.arb.

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga referència: 454329) *Codi SAP: 10007915*

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat de sodi 13x75 mm *Codi SAP: 10014982*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a tempertura ambient
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q54385 4800 Srm—Troponina T; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra) ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [206]; ≤ 24 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 mesos a -20 ºC [7]

Q54366U 9292 Pla—Troponina T; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitu (indica com conservar la mostra) ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [206]; ≤ 24 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 mesos a -20 ºC [7]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q54485 3541 Srm—Urat; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 3 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]

Q54466U 9045 Pla—Urat; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 12 hores a (15-25) ºC

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W01258 3997 Uri—Urat / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* *--*

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (20-25) ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q54685 3111 Srm—Urea; c.subst.

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** —

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP:* *10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP:* *10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP:* *10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP:* *10014632*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q54666U 9089 Pla—Urea; c.subst.

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP:* *10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].

Q54648 4052 LPt(Diàlisi)—Urea; c.subst.

Tipus de mostra Líquid peritoneal **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP:* *10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) —

Q54658 3972 Uri—Urea; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra és recollida des de la UCI.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud (indica com conservar la mostra) ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [323]

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q54658U 9123 Uri—Urea; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Orina **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 1 setmana a (4-8) ºC (pH≤ 7) [10]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

W01358 3991 Uri—Urea / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari Recipient subministrat per l'usuari *Codi SAP:* --

Recipient secundari Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic *Codi SAP:* *10013978*

Condicions d'obtenció de la mostra La mostra ha de ser l'orina de primera hora del matí.

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [323]
(Indica com conservar la mostra)

Q54600 3411 Líquid—Urea; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP:* *10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP:* *10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà, identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del lliurament.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitu —
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q54600U 9152 Líquid—Urea; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra Líquid no definit **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(Indica com conservar la mostra)

W58885 7108 Srm—Ustekinumab; c.massa(CLIA)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció predosi.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (18-24) °C; ≤ 8 dies a (2-8) °C; > 8 dies a ≤ -20 °C
(Indica com conservar la mostra)

Q54866U 9106 Pla—Valproat; c.massa

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** —

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de liti 13X75 mm *Codi SAP: 10014630*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [7]; ≤ 1 dia a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q54885 3760 Srm—Valproat; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,1 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra L'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitu ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96]; ≤ 24 hores a (4) ºC [96]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(Indica com conservar la mostra)

W11885 3754 Srm—Valproat(lliure); c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció predosi.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitu ≤ 15 dies a (2-8) ºC; ≤ 28 dies a ≤ -20 ºC
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q55185 3787 Srm—Vancomicina; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96], ≤ 24 hores a (2-8) ºC [96], ≤ 1 mes -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q55144 3786 LCR—Vancomicina; c.massa

Tipus de mostra Líquid cèfalo-raquidi **Volum mínim** 0,2 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb tap roscat, no estèril ("Líquids") *Codi SAP: 10000591*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores tapat a (15-25) ºC [7]; ≤ 48 hores tapat a (2-8) ºC [7]; ≤ 28 dies tapat a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W58785 7892 Srm—Vedolizumab; c.massa(CLIA)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel separador 16x100 mm *Codi SAP: 10014790*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a temperatura ambient (18-25) ºC; ≤ 8 dies a nevera (2-8) ºC; > 8 dies a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

H10572U 9073 Ers(San)—Volum eritrocític; amplada de la distribució rel. (urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10572 1162 Ers(San)—Volum eritrocític; amplada de la distribució rel. (no urgent)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 3 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10007897*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb EDTA K3 13x75 mm *Codi SAP: 10014981*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

Q94685 3753 Srm—Voriconazol; c.massa

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga ref.456210) *Codi SAP: 10014965*

Recipient secundari Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb tap (Ref. tap inclòs: 60.557) *Codi SAP: 10019563*

Condicions d'obtenció de la mostra La petició ha d'anar acompanyada de les següents dades: pauta de tractament, hora exacta de la dosis i hora d'extracció. També es pot enviar plasma obtingut en tub d'EDTA K3 o en tub d'Heparina.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Trasferiu el sèrum al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q55785 3468 Srm—Zinc; c.susbt.(SRM 3168a; Espectrometria d'absorciò atòmica de flama)

Tipus de mostra Serum **Volum mínim** 1,5 mL

Preparació pacient Dejú de 8 h

Recipient primari Tub BD tap ocre de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm (etiq. Paper) *Codi SAP: 10024976*

Condicions d'obtenció de la mostra posar immediatament a una temperatura diferent de l'ambient (2 - 8) ºC.
Un cop recollida la mostra de sang, aquesta s'ha de col·locar en nevera o sobre gel i deixar-les coagular durant 30-40 minuts, i després centrifugar-les per separar el sèrum. Aquest procediment minimitza qualsevol transferència de zinc de les cèl·lules al sèrum. Alternativament, si la centrifugació in situ no és factible, llavors la sang s'ha de col·locar en una nevera o refrigerador immediatament després de la recollida, i mantenir-la a (2 - 8) ºC durant un màxim de 24 hores abans de ser centrifugada [353,354]

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2 - 8) ºC, i transferiu al recipient secundari.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a □□(2 - 8) ºC; ≤ 3 mesos□□ a□□ ≤ (-18) ºC [352,353,354]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W33285 4503 Srm—Zonisamida; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra Sèrum **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10016363*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient secundari Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm, sense tap (aliquotadora RSA-PRO) *Codi SAP: 10000862*

Condicions d'obtenció de la mostra S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitu ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(Indica com conservar la mostra)

GE97611 4653 Estudi genètic de la malaltia de Bartter (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC.Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 3 dies a (2-8) ºC;
(Indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

GN28811 4654 Estudi genètic de la malaltia de Bartter (cas familiar)

Tipus de mostra Sang **Volum mínim** 9 mL

Preparació pacient —

Recipient primari Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3 16x100 mm (ref. 455036) *Codi SAP: 10007903*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Cap. Conserveu a (2-8) ºC.Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 3 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)

NO en té 10000 Magnitud fictícia, necessaria per vincular reactius almenys amb una mag, per a plantilla de IT magnituds

Tipus de mostra Plasma **Volum mínim** 1 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8] i no es pot asseure ni aixecar durant les 8 hores abans de l'obtenció de les mostres. L'extracció és convenient que es realitzi entre les 8:00 i les 9:00 hores. Si la prova s'ha de realitzar en un pacient ambulatori ha de restar estirat un mínim d'una hora abans de l'extracció.

Condicions d'obtenció de la mostra També es pot utilitzar sèrum o plasma amb heparina.

Tractament de la mostra Centrifugueu a 2 000 g durant 12 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari i congeleu

Estabilitat de la magnitu ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Espècimen, recipient de recollida i additius

Data d'actualització: 24/03/2025

W94085 3234 Pac—Índex predictiu de resistència a la insulina (HOMA-IR); prop.arb.

Tipus de mostra Càlcul **Volum mínim** 0,5 mL

Preparació pacient En dejú de 9 hores [8]. En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel i activador de coagulació 16x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10010742*

Recipient primari (alternatiu) (ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel separador 13x75 mm *Codi SAP: 10014632*

Recipient primari (alternatiu) (UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST II Advance *Codi SAP: 10006094*

Condicions d'obtenció de la mostra —

Tractament de la mostra Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

NO en té 2122 Avaluació clínica i recomanacións terapèutiques

Tipus de mostra **Volum mínim**

Preparació pacient

Recipient primari (alternatiu) (LV pediàtrics) Tub BD Vacutainer citrat Na 75x13mm 1,8 mL (tap blau) *Codi SAP: 10028700*

Condicions d'obtenció de la mostra

Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)